

Skrivningskod:   
Glöm den inte!

Om du vill:   
Lägg till tre bokstäver.

KTH Matematik  
Olof Heden

$\Sigma$ p	G/U	bonus

Efternamn	förnamn	pnr	årskurs

**Kontrollskrivning 1B, on 14 november 2007, 13.15–14.15,  
i SF1610 Diskret matematik för IT2.**

Inga hjälpmedel tillåtna.

Minst 8 poäng ger godkänt.

Godkänd ks  $n$  medför godkänd uppgift  $n$  vid tentor till (men inte med) nästa ordinarie tenta (högst ett år),  $n = 1, \dots, 5$ .

13–15 poäng ger ett ytterligare bonuspoäng till tentamen.

**Uppgifterna 3)–5) kräver väl motiverade lösningar för full poäng.**

Uppgifterna står inte säkert i svårighetsordning.

**Spara alltid återlämnade skrivningar till slutet av kursen!**

Skriv dina lösningar och svar på samma blad som uppgifterna, använd baksidan om det behövs.

1) (För varje delfråga ger rätt svar  $\frac{1}{2}$ p, inget svar 0p, fel svar  $-\frac{1}{2}$ p.

Totalpoängen på uppgiften rundas av uppåt till närmaste icke-negativa heltal.)

**Kryssa för** om påståendena **a)–f)** är sanna eller falska (eller avstå!)

a) 153 är ett primtal.

b) Om  $p$  är ett primtal och  $p$  delar produkten  $ab$  så delar  $p$  minst ett av de hela talen  $a$  och  $b$

c) Ringen  $Z_{13}$  innehåller 11 inverterbara element.

d)  $(A \cap B)^c \cap (A^c \cup B^c) = \emptyset$ .

e) Varje **injektion**  $f : \{1, 2, 4\} \rightarrow \{2, 4, 6\}$  är också en **bijektion**.

f) De rationella talen är inte en uppräknelig mängd.

sant	falskt
	x
x	
	x
	x
x	
	x

poäng uppg.1

Namn	poäng uppg.2

**2a)** (1p) Låt  $A = \{\emptyset, 1\}$  och  $B = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$  ange antalet element i  $A \times B$ .

**SVAR:** 4

**b)** (1p) Ange ett element  $x$  i ringen  $Z_9$  sådant att  $x + 7 = 5$ .

**SVAR:** 7

**c)** (1p) Ange en surjektiv funktion från  $A = \{a, b, c, d\}$  till  $B = \{a, b, c\}$ .

**SVAR:**  $f(a) = a, f(b) = b, f(c) = c, f(d) = c$ .

Namn	poäng uppg.3

3) (3p) Avgör om 32 är **inverterbart** i  $\mathbb{Z}_{149}$ . Om det är det, bestäm inversen.

**LÖSNING:** Euklides algoritm ger

$$149 = 5 \cdot 32 - 11$$

$$32 = 3 \cdot 11 - 1$$

Vi ser att 32 är relativt primt till 149 och därför inverterbart. Räkningarna ovan ger nu

$$1 = 3 \cdot 11 - 32 = 3(5 \cdot 32 - 149) - 32 = 14 \cdot 32 - 3 \cdot 149,$$

dvs

$$1 = 14 \cdot 32 - 3 \cdot 149.$$

Vi räknar nu modulo 149 och från ovan får vi

$$14 \cdot 32 \equiv 1 \pmod{149}.$$

**SVAR:** 14

Namn	poäng uppg.4

4) (3p) Visa att relationen  $R$  definierad genom att  $aRb$  om 7 delar  $a - b$  är en ekvivalensrelation på mängden av hela tal.

**LÖSNING:**

(i) 7 delar talet 0 så 7 delar  $a - a$  för alla  $a$ , dvs  $aRa$  för alla  $a$ . Vi har nu visat

$$aRa \quad \text{för alla } a.$$

(ii) Om  $aRb$  så gäller att 7delar  $a - b$  dvs  $a - b = k \cdot 7$  men då gäller också att 7 delar  $b - a$  eftersom  $b - a = (-k) \cdot 7$ . Vi har nu visat

$$aRb \quad \Rightarrow \quad bRa.$$

(iii) Om  $aRb$  och  $bRc$  så gäller att 7 delar  $a - b$  dvs  $a - b = k \cdot 7$  och 7 delar  $b - c$  dvs  $b - c = k' \cdot 7$  men då gäller också att 7 delar  $a - c$  eftersom  $a - c = (k + k') \cdot 7$ . Vi har nu visat

$$aRb \quad \text{och} \quad bRc \quad \Rightarrow \quad aRc.$$

Egenskaperna (i), (ii) och (iii) visar att  $R$  är en ekvivalensrelation.

Namn	poäng uppg.5

5) (3p) Bestäm den minsta positiva resten vid division av talet  $35^{122}$  med 17.

**LÖSNING:** Då  $35 \equiv 1 \pmod{17}$  får vi att

$$35^{122} \equiv_{17} 1^{122} \equiv_{17} 1.$$