



KTH Teknikvetenskap

SF1620 Matematik och modeller
Lösningförslag med bedömningskriterier till kontrollskrivning 4, 2007

Uppgift

- a) Bestäm arean mellan graferna för funktionerna $f(x) = 1/x$ och $g(x) = 3/(x + 3)$ på intervallet $1 \leq x \leq 3$. Ange svaret som ett närmevärde med två decimalers noggrannhet. (4)

- b) Använd variabelbytet $t = \cos x$ för att beräkna det exakta värdet av integralen

$$\int_0^{\pi} \sin^3 x \cos^4 x dx.$$

(3)

- c) Beräkna det fel man får vid användning av trapetsmetoden med fyra delintervall för ett andragradspolynom $p(x) = ax^2 + bx + c$ på intervallet $0 \leq x \leq 3$. (2)

Lösningförslag

- a) För att se vilken av graferna som ligger över den andra letar vi först efter värden då graferna skär varandra, dvs när funktionerna är lika. Vi har att

$$f(x) = g(x) \quad \iff \quad \frac{1}{x} = \frac{3}{x+3}.$$

Eftersom varken $x = 0$ eller $x + 3 = 0$ i intervallet kan vi multiplicera med $x(x + 3)$ och får då

$$x + 3 = 3x \quad \iff \quad 2x = 3$$

dvs $x = 3/2$ som ligger i intervallet. Eftersom $f(1) = 1 > 3/4 = g(1)$ ligger $f(x)$ över $g(x)$ till vänster om $x = 3/2$ och tvärtom till höger om $x = 3/2$. För positiva x är $\ln x$ en primitiv funktion till $1/x$ och därmed är $3 \ln(x + 3)$ en primitiv funktion till $3/(x + 3)$. Vi får arean mellan

graferna som summan av integralerna


$$\begin{aligned} \int_1^{3/2} \frac{1}{x} - \frac{3}{x+3} dx &= [\ln x - 3 \ln(x+3)]_1^{3/2} \\ &= \ln(3/2) - 3 \ln(3/2 + 3) - \ln(1) + 3 \ln(4) \\ &= \ln 3 - \ln 2 - 6 \ln 3 + 3 \ln 2 - 0 + 6 \ln 2 \\ &= 8 \ln 2 - 5 \ln 3. \end{aligned}$$

och

$$\begin{aligned} \int_{3/2}^3 \frac{3}{x+3} - \frac{1}{x} dx &= [3 \ln(x+3) - \ln x]_{3/2}^3 \\ &= 3 \ln(6) - \ln(3) - 3 \ln(9/2) + \ln(3/2) \\ &= 3 \ln 3 + 3 \ln 2 - \ln 3 - 6 \ln 3 + 3 \ln 2 + \ln 3 - \ln 2 \\ &= 5 \ln 2 - 3 \ln 3. \end{aligned}$$

Sammantaget blir arean

$$8 \ln 2 - 5 \ln 3 + 5 \ln 2 - 3 \ln 3 = 13 \ln 2 - 8 \ln 3 \approx 0,22.$$



b) Vi låter $t = \cos x$ och får då att $dt = -\sin x dx$. När $x = 0$ motsvarar $t = 1$ och $x = \pi$ svarar mot $t = -1$. Alltså får vi

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \sin^3 x \cos^4 x dx &= - \int_0^\pi (1 - \cos^2 x) \cos^4 x (-\sin x) dx \\ &= - \int_1^{-1} (1 - t^2) t^4 dt \\ &= - \left[\frac{t^5}{5} - \frac{t^7}{7} \right]_1^{-1} \\ &= - \left(\frac{(-1)^5}{5} - \frac{(-1)^7}{7} - \frac{1^5}{5} + \frac{1^7}{7} \right) \\ &= - \frac{-7 + 5 - 7 + 5}{35} = \frac{4}{35}. \end{aligned}$$

c) Om vi använder trapetsmetoden på en linjär funktion får vi exakt rätt svar, så det enda vi behöver se på är andragradstermen $f(x) = ax^2$. Det exakta svaret ska vara

$$\int_0^3 ax^2 dx = \left[a \frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{27a}{3} - \frac{0 \cdot a}{3} = 9a.$$

Med trapetsmetoden med fyra delintervall får vi delintervallens längd till $\Delta x = (3 - 0)/4 = 3/4$ och approximationen blir

$$\begin{aligned} \int_0^3 ax^2 dx &\approx \frac{\Delta x}{2} (f(0) + 2f(3/4) + 2f(3/2) + 2f(9/4) + f(3)) \\ &= \frac{3}{8} \left(0 + 2 \cdot \frac{9a}{16} + 2 \cdot \frac{9a}{4} + 2 \cdot \frac{81a}{16} + 9a \right) \\ &= \frac{3a}{8} \cdot \frac{0 + 18 + 72 + 162 + 144}{16} = \frac{3a}{8} \cdot \frac{396}{16} = \frac{297a}{32} \end{aligned}$$

Skillnaden mot det exakta värdet är

$$\frac{297a}{32} - 9a = \frac{297a - 288a}{32} = \frac{9a}{32},$$

vilket därmed är det fel som fås. Om vi tar med de andra två termerna i $p(x)$ får vi ytterligare ett bidrag på $9b/2 + 3c$ både i det exakta uttrycket och i approximationen och felet påverkas därmed inte.

Svar:

- a) Arean mellan graferna är $13 \ln 2 - 8 \ln 3 \approx 0,22$ areaenheter.
- b) $\int_0^\pi \sin^3 x \cos^4 x dx = 4/35$.
- c) Felet blir $9a/32$ om vi använder trapetsmetoden med fyra delintervall.

Bedömningskriterier

- a) – Korrekt uppdelning av arean i två integraler, **1 poäng**.
 - Korrekta primitiva funktioner, **1 poäng**.
 - Korrekt insättning av gränserna, **1 poäng**.
 - Korrekt slutförd beräkning inklusive korrekt svar, **1 poäng**.
 - Sammanlagt högst tre poäng om svaret ej är angivet med korrekt noggrannhet.
- b) – Korrekt utfört varabelbyte med avseende på integrand och integrationsgränser, **1 poäng**.
 - Korrekta primitiva funktioner, **1 poäng**.
 - Korrekt slutförd beräkning inklusive korrekt svar, **1 poäng**.
- c) – Korrekt användning av trapetsmetoden, **1 poäng**.
 - Korrekt slutsats om felets storlek, **1 poäng**.

Bedömning av presentationen

Presentationen av lösningen bedöms med 0-3 poäng enligt följande:

- 0p** Lösningen saknar helt förklarande text eller är mycket osammanhängande med ekvationer, formler och beräkningar utspridda över papperet.
- 1p** Lösningen har dåligt med förklarande text eller förklarande text som är tvetydig eller svår att förstå.
- 2p** Lösningen har förklarande text till de flesta formler och beräkningar, men inte överallt där det skulle behövas, eller lösningen har förklarande text i så stor omfattning att tankegången drunknar i text.
- 3p** Lösningen har bra förklarande text till alla formler och beräkningar.

Egenbedömning

Studenten skall bedöma sin egen lösning enligt de bedömningskriterier som ges ovan. Bedömningen skall motiveras och eventuella slarvfel identifieras. I de fall lösningen avviker mycket från lösningsförslaget kan bedömningskriterierna vara svåra att tillämpa. I dessa fall får studenten föreslå en helt egen bedömning med motivering. Detta måste markeras tydligt.

Slutgranskning

Skrivningarna slutgranskas och poängsätts av examinator.