

Lösningar till tenta B i 5B1204 DISKRET MATEMATIK för D och 5B1203 DISKRET MATEMATIK för F3 och F1spec den 21 maj 2007.

1. (3p) Formulera och bevisa Faktorsatsen för polynomringen över en ändlig kropp.
2. (3p) Ett RSA-krypto har de offentliga nycklarna $n = 33$ och $e = 7$. Dekryptera meddelandet 5.

Lösning: Då $n = 33 = 3 \cdot 11$ har vi att $m = 2 \cdot 10 = 20$. Dekrypteringsnyckeln d skall satisfiera $e \cdot d = 1$ i ringen Z_m . Då $e = 7$ finner vi, med hjälp av multiplikationstabellen att $d = 3$. Det dekrypterade meddelandet är ju $D(5) = 5^d \pmod{33}$. Då $5^3 = 125 \equiv_{33} 26$ har vi

Svar: 26.

3. (3p) Gruppen $(Z_{19} \setminus \{0\}, \cdot)$ är cyklisk. Bestäm ett element α som genererar denna grupp.

Lösning: Den givna gruppen $G = (Z_{19} \setminus \{0\}, \cdot)$ har 18 element, så vi skall bestämma ett element av ordning 18. Vi använder att för varje element $g \in G$ gäller att $\sigma(g) | 18$. Vi börjar med att testa om elementet 2 har ordning 18:

$$\begin{aligned} 2^2 = 4 \neq 1 &\implies \sigma(2) \neq 2. \\ 2^3 = 8 \neq 1 &\implies \sigma(2) \neq 3. \\ 2^6 = 7 \neq 1 &\implies \sigma(2) \neq 6. \\ 2^9 = 18 \neq 1 &\implies \sigma(2) \neq 9. \end{aligned} \quad \text{Då givetvis } \sigma(2) \neq 1 \text{ så finns bara möjligheten att } \sigma(2) = 18 \text{ kvar.}$$

Svar: Elementet 2 genererar $(Z_{19} \setminus \{0\}, \cdot)$.

4. (3p) Undersök om polynomet $x^3 + x + 1$ är irreducibelt i polynomringen $Z_7[x]$.

Lösning: Vore det inte irreducibelt skulle polynomet ha en faktoruppdelning

$$x^3 + x + 1 = p(x)q(x) = (x - \alpha)q(x).$$

Elementet α vore då ett nollställe till polynomet. Vi testar om $x^3 + x + 1$ har nollställena i Z_7 :

$$\begin{aligned} 0^3 + 0 + 1 &= 1 \neq 0 \\ 1^3 + 1 + 1 &= 3 \neq 0 \\ 2^3 + 2 + 1 &= 4 \neq 0 \\ 3^3 + 3 + 1 &= 3 \neq 0 \\ 4^3 + 4 + 1 &= 6 \neq 0 \\ 5^3 + 5 + 1 &= 5 \neq 0 \\ 6^3 + 6 + 1 &= 6 \neq 0 \end{aligned}$$

Tabellen ovan visar att polynomet $x^3 + x + 1$ saknar nollställena i Z_7 och är alltså irreducibelt i $Z_7[x]$.

5. (3p) Kroppen F med 25 element består av polynom av grad högst 1, med koefficienter i Z_5 , och man räknar i F som om $x^2 + 2 = 0$. Dvs

$$F = \{ax + b \mid a, b \in Z_5\} \quad \text{och} \quad x^2 = 3.$$

Bestäm ett element z i denna kropp sådant att $(2x + 1)z = x$.

Lösning: Först söker vi inversen till $2x + 1$ i kroppen F . Euklides algoritmen ger

$$x^2 + 2 = (2x + 1)(3x + 1) + 1$$

Varur vi direkt finner att $1 = (x^2 + 2) - (3x + 1)(2x + 1)$ eller

$$(2x + 4)(2x + 1) = 1 - (x^2 + 2).$$

Inversen till $2x + 1$ är alltså $2x + 4$.

Det gäller då att

$$z = (2x + 1)^{-1}x = (2x + 4)x = 2x^2 + 4x = 2 \cdot 3 + 2x = 4x + 1.$$

Svar: $z = 4x + 1$.

6. (3p) Visa att nedanstående, ej färdigt ifyllda tabell, aldrig kan kompletteras till en gruppabell:

o	e	a	b	c	d
e	e	a	b	c	d
a	a	e			
b					
c					
d					

Lösning: Ur tabellen framgår att $a \circ e = a$ vilket ger att e är det unika identitets-elementet i gruppen. För elementet a gäller att $a \circ a = e$. Om det finnes en grupp med den givna multiplikationstabellen skulle gruppen bestå av fem element, varav ett av elementen, elementet a , skulle ha ordning 2. Då talet 2 inte delar talet 5 så är detta omöjligt. Det finns ingen grupp med denna egenskap.

7. (3p) Tyvärr råkade någon välja en oäkta kontrollmatrix (paritycheck-matrix) för att skapa en 1-felsrättande kod, enligt nedan:

$$C = \{\bar{c} = (c_1, c_2, \dots, c_7) \mid H\bar{c}^T = (0 \ 0 \ 0)^T\} \quad \text{där} \quad H = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Det är för sent att ändra så vissa ord i koden går inte att använda. Man måste därför utesluta ord ur C och skapa en ny 1-felsrättande kod C' , dvs

$$C' \subseteq C, \quad \text{och} \quad C' \text{ är 1-felsrättande.}$$

Hur många ord kan C' ha maximalt, givet kontrollmatrisen H ovan. (Denna kontrollmatrix skall vid felrättning användas på sedvanligt sätt.)

Lösning: Tyvärr inget ord alls. Antag att avsändaren bara använder ett ord, ordet \bar{c} . Om ett fel uppstår i position nummer 1 så kommer

$$H\bar{c}^T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

och mottagaren vet inte om felet uppstått i position nummer ett eller fyra.

8. (3p) Låt H och K vara två delgrupper till en grupp G . Räcker nedanstående information för att bestämma antalet element i $H \cap K$.
- 1) Gruppen G är cyklisk.
 - 2) Antalet element i H är n .
 - 3) Antalet element i K är m .

Lösning: Vi visar att informationen räcker. Vi använder satsen som säger att om G är en cyklisk grupp så är varje delgrupp till G en cyklisk grupp och till varje delare d till antalet element i G finns precis en delgrupp till G med d stycken element (om G cyklisk alltså).

Låt nu

$$D = \text{sgd}(|H|, |K|).$$

Då gäller att D delar $|H|$ och $|K|$, men även $|G|$ eftersom, enligt Lagranges sats, $|H|$ delar $|G|$. Enligt satsen är även H och K cykliska grupper. Det finns alltså, återigen enligt satsen, delgrupper L , L_H och L_K till G , H och K respektive som samtliga har precis D stycken element.

Grupperna L_H och L_K är delgrupper även till G , och eftersom G bara har en delgrupp med D element så måste

$$L_H = L = L_K.$$

Då L delgrupp till både H och K så måste L vara en delgrupp till $H \cap K$, och därmed

$$D = |L| \leq |H \cap K|.$$

$H \cap K$ är en delgrupp till både H och K , så antalet element i $H \cap K$ delar både $|H|$ och $|K|$. Eftersom då $|H \cap K|$ delar både $|H|$ och $|K|$ så gäller att $|H \cap K|$ delar talet D . Således

$$|H \cap K| \leq D.$$

Enda möjligheten är att $|H \cap K| = |L| = D = \text{sgd}(n, m)$.