

KTH Matematik  
Hans Thunberg

SF1622 Envariabelanalys och Linjär Algebra  
HT 2008 för Öppen Ingång

### Grupparbete till lektionspass L8, 14/11.

(1) Visa att

$$\frac{1}{2} < \int_0^2 \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} < 1.$$

Tips: Dela integrationsintervallet i fyra lika stora delar och stäng in integranden mellan lämpliga trappfunktioner.

(2) Uppgift 6.8 i *Övningar i Analys i en variabel*

(3) Uppgift 6.9 i *Övningar i Analys i en variabel*

(4) (Ett bevis för Differential- och Integralkalkylens huvudsats.)

Om  $f$  är en kontinuerlig funktion och  $S(x) = \int_a^x f(t) dt$ , där  $a$  är en konstant, förklara varför

$$S'(x) = f(x).$$

Ett tips är att börja med att utifrån en figur som den i föregående uppgift motivera varför  $S(x + \Delta x) - S(x) \approx f(x)\Delta x$ .

*Kommentar.* Från huvudsatsens påstående att  $S(x)$  definierad som ovan är en primitiv funktion till  $f(x)$  kan man sedan bevisa insättningsformeln  $\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$ , där  $F$  är en godtycklig primitiv till  $f$  (se t ex Persson-Böiers sid 298)

(5) Betrakta det område som bestäms av olikheterna  $x > 0$  och  $0 < y < \frac{1}{x^2+1}$ . Har området en ändlig area? (Uppgiften kan lösas på minst två olika sätt)

#### Extrauppgift: Ett annat sätt att se på insättningsformeln

Antag att vi känner funktionen  $F$ 's värde i punkten  $x = a$ , och att vi också känner värdet av funktionens derivata i punkter  $x$ ,  $a < x < b$ . (I övrigt är funktionen  $F$  okänd.) Utifrån detta vill vi beräkna funktionsvärdet  $F(b)$ .

Det verkar rimligt att vi kan rekonstruera grafen  $y = F(x)$ : Vi vet att vi ska starta i punkten  $(a, F(a))$  och sedan hela tiden röra oss åt höger i en riktning som i varje punkt ges av derivatan (som antogs vara känd).

Mer precist kan man göra så här:

- Dela intervallet  $[a, b]$  i  $n$  st. delintervall med hjälp av punkter

$$x_0 = a < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b.$$

- Om  $\Delta x_0 = x_1 - x_0$  är litet kan man hävda att

$$F(x_1) \approx F(x_0) + F'(x_0)\Delta x_0 = F(a) + F'(x_0)\Delta x_0$$

Varför då?

- På samma sätt kan man hävda att

$$F(x_2) \approx F(x_1) + F'(x_1)\Delta x_1$$

om  $\Delta x_1 = x_2 - x_1$  är litet. Alltså är då

$$F(x_2) \approx F(a) + F'(x_0)\Delta x_0 + F'(x_1)\Delta x_1.$$

- Genom att upprepa detta resonemang kommer vi fram till att

$$F(b) = F(x_n) \approx F(a) + F'(x_0)\Delta x_0 + F'(x_1)\Delta x_1 + \cdots + F'(x_{n-1})\Delta x_{n-1},$$

vilket också kan skrivas som

$$F(b) - F(a) \approx \sum_{k=0}^{n-1} F'(x_k)\Delta x_k \approx \int_a^b f(x) dx$$

eftersom mittenledet är en Riemannsumma till  $f(x) = F'(x)$  på intervallet  $(a, b)$ .