

## FÖRELÄSNING Om Taylorsutveckling

### Taylors Sats och dess tillämpningar

**Problem:** Givet en funktion  $f(x)$  definierad i en öppen omgivning till  $x = a$ .

(i) kan vi approximera funktionen  $f(x)$  med ett polynom  $P_n(x)$  av grad  $n$  i närheten

$$\text{av } x = a, \text{ där } P_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x-a)^k.$$

(ii) Hur bra är approximationen, dvs hur "litet" eller "stort" är felet  $r_n(x)$ , där

$$|r_n(x)| = |f(x) - P_n(x)|.$$

### 1. Approximation av grad ett eller linjär approximation

Finn ett polynom av grad ett:  $P_1(x) = a_0 + a_1(x-a)$  som kan approximera  $f(x)$  så bra som möjligt nära  $x = a$ . Vi försöker att approximera  $f(x)$  med dess tangentlinjen som går genom  $(a, f(a))$ . Denna ges av  $P_1(x) = f(a) + (x-a)f'(a)$ . Felet  $r_1(x)$  ges då av  $|r_1(x)| = |f(x) - P_1(x)|$ .

**Ex1:** Låt  $f(x) = \frac{1}{3}x^2$  och  $a = 3$ .

Hur bra kan tangentlinjen  $P_1(x)$  till  $f(x)$  approximera  $f(x)$  nära  $x = 3$ .

Lösning:

Tangentlinjens ekvation ges av  $P_1(x) = f(3) + (x-3)f'(3) = 2x - 3$ .


Felet  $|r_1(x)| = \left| \frac{1}{3}x^2 - (2x - 3) \right| = \left| \frac{(x-3)^2}{3} \right| = \frac{|x-3|^2}{3}$ . Storlek hos felet beror på

avståndet från  $x = 3$

Således om vi väljer  $|x-3| \leq 10^{-3} \Rightarrow |r_1(x)| \leq \frac{1}{3}(10^{-3})^2 = \frac{1}{3}10^{-6}$ .

En bra approximation

En bild



2. Approximation av grad två eller att approximera en funktion med ett andra grad polynom

Finn ett polynom av grad två :  $P_2(x) = a_0 + a_1(x - a) + a_2(x - a)^2$  som kan approximera  $f(x)$  så bra som möjligt nära  $x = a$ .

Ett sätt att finna konstanterna  $a_0, a_1, a_2$  är att låta :

$$f(a) = P_2(a), \quad f'(a) = P_2'(a), \quad f''(a) = P_2''(a)$$

$$\text{Detta ger } a_0 = f(a), \quad a_1 = f'(a), \quad a_2 = \frac{1}{2}f''(a)$$

Det sökta polynomet blir:  $P_2(x) = f(a) + (x - a)f'(a) + \frac{1}{2}(x - a)^2 f''(a)$ .

Felet blir då i närheten av  $x = a$ ,  $|r_2(x)| = |f(x) - P_2(x)|$ .

Ex 2. Approximera  $f(x) = e^x$ , nära  $x = 0$ . dels med ett polynom av grad ett, dels med ett polynom av grad två och jämför felet.

Lösning


Här fås  $P_1(x) = 1 + x$  tangentlinjen i punkten  $(0, f(0))$ , och  $P_2(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2$

Vi ställer upp en tabell för små  $x$  och för stora  $x$

$x$	små värden av $x$			$x$	stora värden på $x$		
	$e^x$	$P_1(x)$	$P_2(x)$		$e^x$	$P_1(x)$	$P_2(x)$
-0.4	0.6703	0.6000	0.6800	-2.0	0.1353	-1.000	1.0000
-0.3	0.7408	0.7000	0.7450	-1.5	0.2231	-0.5000	0.6250
-0.2	0.8187	0.8000	0.8200	-1.0	0.3679	0.0000	0.5000
-0.1	0.9187	0.9000	0.9050	-0.5	0.6065	0.50000	0.6250
<u>0.0</u>	<u>1.0000</u>	<u>1.0000</u>	<u>1.0000</u>	<u>0.0</u>	<u>1.0000</u>	<u>1.0000</u>	<u>1.0000</u>
0.2	1.2214	1.2000	1.2200	1.0	2.7183	2.0000	2.5000

Ovan stående tabell ger att skall vi ha ett bra approximation av  $f(x)$  nära  $x = a$ , så måste vi öka graden av approximationen, dvs öka graden hos polynomet  $P_n(x)$

En bild:



Kurvan  $1 + x + \frac{x^2}{2}$  ligger närmare kurvan  $e^x$  än kurvan  $1 + x$ .

Vi säger att

$$1 + x + \frac{x^2}{2} \text{ approximerar bättre } e^x \text{ än } 1 + x$$

3. Approximation av grad  $n$  eller att approximera en funktion med ett polynom av grad  $n$

Allmänt kan vi approximera funktionen  $f(x)$  nära  $x = a$  med ett polynom  $P_n(x)$  av grad  $n$ .

där  $P_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x-a)^k$  och konstanterna  $a_k, k = 0, 1, 2, 3, \dots, n$  skall bestämmas

sådana att

$$P_n^{(k)}(a) = f^{(k)}(a), k = 0, 1, 2, \dots, n$$

under villkoren att funktionen  $f(x)$  nära  $x = a$  är tillräckligt "snäll"

Vi gör följande definition:

**Polynomet:**

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

kallas Taylorpolynomet av grad  $n$  nära  $x = a$  till  $f(x)$ . (Då  $a = 0$  även MacLaurinpolynomet).

**Taylorformel**

Låt  $f^{(k)}(x), k = 0, 1, 2, 3, \dots, n+1$  vara kontinuerliga i ett intervall  $(x_1, x_2)$  som innehåller punkten  $a$ .

Då gäller, för varje  $a \in (x_1, x_2)$  att

$$f(x) = P_n(x) + r_n(x)$$

där  $P_n(x)$  är Taylorpolynomet till  $f(x)$ , och

$r_n(x) = f(x) - P_n(x)$  är restermen eller felet som man gör när man ersätter funktionen  $f(x)$  med Taylorpolynomet av grad  $n$  nära  $x = a$

Olika sätt att skriva restermen

**På Lagranges formen**  $r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}, \quad a \leq c \leq x$

**Att skriva rest termen på ORDO-form.**

I restermen på Lagranges form sätt

$$\max_{a \leq c \leq x} \left| \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \right| = M, \quad \text{då blir } |r_n(x)| \leq M|x-a|^{n+1} (*)$$

Olikheten (\*) tecknas  $r_n(x) = O(x-a)^{n+1}, x \rightarrow a$

Man säger att man har skrivit rest termen  $r_n(x)$  ORDO-form

**Några kända Mac Laurinutvecklingar ( skall kunnas ordentligt)**

$$1. e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + O(x^{n+1}), x \rightarrow 0$$

$$2. \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + O(x^{2n+3}), x \rightarrow 0$$

$$3. \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + O(x^{2n+2}), x \rightarrow 0$$

$$4. \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + O(x^{n+1}), x \rightarrow 0$$

$$5. \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + O(x^{n+2}), x \rightarrow 0$$

$$6. \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)} + O(x^{2n+3}), x \rightarrow 0$$

$$7. (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)x^2}{2!} + \dots + \binom{\alpha}{n} x^n + O(x^{n+1}), x \rightarrow 0$$