

SF1649 Vektoranalys och komplexa funktioner 7,5 hp för CELTE1 vt 2010

Ett *vektorfält* \mathbf{F} är en vektorvärd funktion, som till varje punkt $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ i rummet associerar en vektor

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = (F_1(x_1, x_2, x_3), F_2(x_1, x_2, x_3), F_3(x_1, x_2, x_3)).$$

I *vektoranalysen* studerar man *derivator* och *integraler* av vektorfält. De grundläggande derivationsoperatorerna är

$$\begin{aligned} \text{grad} : \quad & \text{funktioner} \rightarrow \text{vektorfält} \\ & \phi(x_1, x_2, x_3) \mapsto (\partial\phi/\partial x_1, \partial\phi/\partial x_2, \partial\phi/\partial x_3), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{div} : \quad & \text{vektorfält} \rightarrow \text{funktioner} \\ & (F_1, F_2, F_3) \mapsto \partial F_1/\partial x_1 + \partial F_2/\partial x_2 + \partial F_3/\partial x_3, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{rot} : \quad & \text{vektorfält} \rightarrow \text{vektorfält} \\ & (F_1, F_2, F_3) \mapsto \left(\frac{\partial F_3}{\partial x_2} - \frac{\partial F_2}{\partial x_3}, \frac{\partial F_1}{\partial x_3} - \frac{\partial F_3}{\partial x_1}, \frac{\partial F_2}{\partial x_1} - \frac{\partial F_1}{\partial x_2} \right). \end{aligned}$$

Dessa uppträder till exempel i Maxwells ekvationer, som utgör basen för den *elektromagnetiska fältteorin*:

$$\begin{cases} \text{div } \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0, \\ \text{div } \mathbf{B} = 0, \\ \text{rot } \mathbf{E} = -\partial\mathbf{B}/\partial t, \\ \text{rot } \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{i} + \mu_0\epsilon_0 \partial\mathbf{E}/\partial t, \end{cases}$$

där \mathbf{E} = elektriska fältet, \mathbf{B} = magnetiska fältet, ρ = laddningstätheten, \mathbf{i} = strömtätheten och μ_0, ϵ_0 är vissa konstanter.

En intressant sammansättning av differentialoperatorerna ovan är *Laplaceoperatorn* $\Delta = \text{div grad}$:

Δ : funktioner \rightarrow funktioner

$$\phi(x_1, x_2, x_3) \mapsto \sum_{k=1}^3 \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_k^2}.$$

Funktioner ϕ som uppfyller Laplaces ekvation $\Delta\phi = 0$ sägs vara *harmoniska*.
Dirichletproblemet

$$\begin{cases} \Delta\phi = 0 \text{ i ett område } \mathcal{D}, \\ \text{restriktionen av } \phi \text{ till } \mathcal{D}\text{:s rand är en given funktion,} \end{cases}$$

är av fundamental betydelse i den matematiska fysiken.

Integralkalylens fundamentalsats

$$\int_a^b \frac{dF}{dx} dx = F(b) - F(a)$$

har följande generaliseringar:

$$\text{divergenssatsen} \quad \iiint_V \text{div } \mathbf{F} dV = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS,$$

där S = begränsningsytan av volymen V , dV = volymselementet, dS = ytelementet och \mathbf{n} = den utåtriktade enhetsnormalen för ytan S , och

$$\text{Stokes' sats} \quad \iint_S \text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r},$$

där C = randkurvan till ytstycket S .

I växelströmsteorien visar det sig att beräkningarna blir *mycket enklare* om man accepterar *komplexa frekvenser* ω , vilket gör att teorien för *komplexvärda funktioner av en komplex variabel*:

$$w = f(z), \text{ där } z = x + iy \text{ och } w = u + iv \text{ är komplexa variabler,}$$

blir relevant. En sådan funktion kan alternativt ses som en reell avbildning från xy -planet till uv -planet:

$$\begin{cases} u = u(x, y), \\ v = v(x, y). \end{cases}$$

$f(z)$ sägs vara *analytisk* om derivatan $f'(z)$ finns. I så fall uppfyller u och v de så kallade *Cauchy-Riemann ekvationerna*:

$$\begin{cases} \partial u/\partial x = \partial v/\partial y, \\ \partial u/\partial y = -\partial v/\partial x, \end{cases}$$

från vilka det följer att u och v är *harmoniska*: $\Delta u = \Delta v = 0$.

I vår kurs ska vi först bekanta oss med de elementära funktionerna: e^z , $\log z$, $\sin z, \dots$ och sedan lära oss hur man kan använda dessa för att lösa Dirichletproblem i planet.

Det primära syftet med denna kurs är att ge nödvändiga förkunskaper för ämnet *elektromagnetisk fältteori*.

KURSMÅL Efter genomgången kurs SKALL teknologerna kunna följande:

Vektoranalys

- redogöra för begreppen divergens, rotation och gradient, kunna beräkna divergensen och rotationen av vektorfält samt gradienten av funktioner
- förenkla och omforma vektoranalytiska uttryck med hjälp av nablakalkyl
- beräkna flödesintegraler över (i allmänhet krökta) ytor i rummet, givna i parameter- eller ekvationsform,
- redogöra för divergenssatsen och kunna använda den vid beräkning av integraler
- beräkna linjeintegraler i rummet och kunna avgöra när de är oberoende av integrationsvägen
- redogöra för Stokes' sats och kunna använda den i samband med beräkning av linje- och flödesintegraler
- avgöra när ett vektorfält har en skalärpotential och kunna bestämma den i fall den finns
- avgöra när ett vektorfält har en vektorpotential och att i enklare fall kunna bestämma en sådan

- genomföra vektorsanalytiska beräkningar av ovanstående slag inte bara i cartesiska koordinater utan även i ortogonala kroklinjiga koordinater (särskilt cylinder- och sfäriska koordinater)
- redogöra för hur Laplaces och Poissons ekvationer uppkommer inom matematisk fysik samt kunna lösa sådana i enkla fall

Komplexa funktioner

- kunna räkna obehindrat med de komplexa talen i cartesisk och polär framställning, kunna tolka relationer mellan komplexa tal geometriskt i enkla fall, kunna bestämma spegelpunkter med avseende på räta linjer och cirklar
- veta vad som menas med en analytisk funktion och kunna avgöra om en given funktion är analytisk eller ej, till exempel genom att kontrollera Cauchy-Riemann ekvationerna
- veta vad som menas med en konform avbildning
- veta vad som menas med en harmonisk funktion och kunna, till en given harmonisk funktion, bestämma en harmoniskt konjugerad funktion
- kunna redogöra för de elementära analytiska funktionerna, till exempel kunna definiera dem, beräkna deras derivator, utreda eventuella mångtydigheter samt bestämma deras inverser
- veta vad som menas med en Möbiustransformation och kunna avgöra hur en given Möbiustransformation avbildar ett givet cirkelområde eller halvplan; och omvänt, givet två sådana områden kunna bestämma en Möbiustransformation som avbildar det ena på det andra
- i enkla fall kunna avgöra hur andra elementära funktioner avbildar olika områden, och omvänt, kunna hitta en analytisk funktion som utför en given avbildning
- kunna lösa vissa randvärdesproblem för Laplaces ekvation genom konform avbildning på *enkla* områden (till exempel halvplan och cirkelskivor), där det är lätt att hitta lösningar.

Kurslitteratur

- P.C. Matthews, *Vector Calculus*, Springer Undergraduate Mathematics Series, 1998. I kursen ingår kapitlen 1–6 samt avsnitten 8.1 och 8.2.
- Råde - Westergren, BETA, *Mathematics Handbook for Science and Engineering*, Studentlitteratur. Det är tillåtet att använda BETA vid KS:ar och tentor. **Observera** att kapitel **11** samt avsnitten **1** och **5** i kapitel **14** ger en utmärkt sammanfattning av kursen.
- Exempelsamling i vektoranalys (PDF-fil på hemsidan).
- Olle S, *Komplexa funktioner* (PDF-fil på hemsidan). I kursen ingår hela kompendiet *utom* kapitel 8: $i\omega$ -metoden.
- Olle S, *Exempelsamling i komplexa funktioner* (PDF-fil på hemsidan). OBSERVERA: Facit stämmer ofta, men inte alltid.

Matthews och BETA kan köpas i Studentkårens bokhandel.

Förkunskaper: Linjär algebra samt en- och flervariabelsanalys. Dessutom krävs en god portion av fighting spirit.

Undervisningen ges i form av lektioner och räkneövningar.

Lärare Olle Stormark (olles@math.kth.se); sitter i rum 3653 i Klocktornet, Lindstedtsvägen 25 KTH, och har telefonnumret 7907206.

Kurssekreterare Claudette Tedfors (tedfors@kth.se) med telefonnumret 7907214. Claudette har hand om kursregistrering, inrapportering av betyg, samt anmälan till tentor om *Mina Sidor* inte fungerar.

Kontrollskrivningar Det ges tre KS:ar, två på vektoranalysdelen, och en på komplexa funktioner. Godkända KS:ar tillgodoräknas på CELTE:s ordinarie tenta och första omtenta på så sätt att godkänt på KS i ($i = 1, 2$ eller 3) ger godkänt = 3 poäng på tentatal i .

Tentamensskrivningen omfattar cirka 8 tal, och man kan maximalt få 26 poäng. **Betygsgränser:**

- 24–26 p \implies A,
- 21–23 p \implies B,
- 18–20 p \implies C,

- 15–17 p \implies D,
- 12–14 p \implies E,
- 11 p \implies Fx \implies får komplettera,
- $\leq 10 \implies$ F.

Ordinarie tentan ges fredagen den 28:e maj, klockan 14.00–19.00, preliminärt i salarna V32–V35.

Tentamensanmälan kan göras från och med den 12:e april till och med den 16:e maj, klockan 24.00.

Klagomål på rättningen görs skriftligt på blanketter som tillhandahålles av matematikinstitutionens studentexpedition.

PRELIMINÄR KURSPLANERING

V = Vector Calculus, **EV** = Exempelsamling i vektoranalys, **K** = Kompendium i komplexa funktioner, **EK** = exempelsamling i komplexa funktioner.

Läxtal: Observera att **V** innehåller *kompleta lösningar* till *samtliga* övningsexempel! Några av de svårare gås igenom på tavlan, men resten ska Osquarulda av ren självbevarelsedrift *räkna själv!!!*

Lektion 1 mån 22/3 10–12 i Q34: Inledning till kursen och snabb genomgång av kapitel 1 i **V**.

Lektion 2 tis 23/3 13–15 i L52: Linjeintegraler i rummet, avsnitten 2.1 och 2.2 i **V**.

Övning 1 tis 23/3, 15–17 i L52: Räkna talen 1, 3, 4, 9, 26, 30, 32 i **EV**.

Lektion 3 ons 24/3 10–12 i L52: Flödesintegraler och volymsintegraler, avsnitten 2.3 och 2.4 i **V**.

Lektion 4 tor 25/3 10–12 i L52: Gradienten, avsnitten 3.1 och 3.2 i **V**.

Lektion 5 fre 26/3 10–12 i V34: Divergens och rotation, avsnitten 3.3 och 3.4 i **V**.

Lektion 6 mån 29/3 13–15 i L52: Indexräkning, avsnitten 4.1–4.4 i **V**.

Lektion 7 tis 30/3 13–15 i L52: Grad, div och rot med indexräkning, avsnitten 4.5–4.7 i **V**.

Övning 2 tis 30/3 15–17 i L52: Räkna talen 33a, 33b, 13, 18, 22, 37, 38, 65a, 65b, 65c, 66a, 66b i **EV**.

Lektion 8 ons 31/3 10–12 i L52: Sammanfattning av kapitel 4 i **V**.

Lektion 9 tor 1/4 10–12 i L52: Divergenssatsen, avsnitt 5.1 i **V**.

KS 1 på kapitlen 1–4 i V tor 1/4 13–15 i L51–L52.

Påsklov

Lektion 10 mån 12/4 13–15 i L52: Stokes' sats, avsnitt 5.2 i **V**.

Lektion 11 tis 13/4 13–15 i L52: Sammanfattning av kapitel 5.

Övning 3 tis 13/4 15–17 i L52: Räkna talen 66, 70, 71, 74, 80, 86 i **EV**.

Lektion 12 ons 14/4 10–12 i L52: Kroklinjiga koordinater, avsnitten 6.1 och 6.2 i **V**.

Lektion 13 tor 15/4 10–12 i L52: Cylindriska och sfäriska koordinater, avsnitten 6.3 och 6.4 i **V**.

Övning 4 tor 15/4 13–15 i L52: Räkna talen 89, 95, 96, 98, 103, 111 i **EV**.

Lektion 14 mån 26/4 13–15 i L52: Värmeledningsekvationen och lite grand om elektromagnetism, avsnitten 8.1 och 8.2 i **V**.

Lektion 15 tis 27/4 08–10 i L52: Komplexa tal, kapitel 2 i **K**.

KS 2 på kapitlen 5, 6 och 8 i V tis 27/4 14–16 i L52 och L21.

Lektion 16 ons 28/4 10–12 i L52: Riemannsfären, kapitel 3 i **K**.

Lektion 17 tor 29/4 10–12 i L52: Polynom och exponentialfunktionen, kapitel 4 i **K**.

Övning 5 tor 29/4 13–15 i L52: Räkna talen 1a, 2a, 6a, 6d, 9a, 12, 14, 20a, 20b, 21a i **EK**.

Lektion 18 mån 3/5 13–15 i L52: Cauchy-Riemann ekvationerna, kapitel 5 i **K**.

Lektion 19 tis 4/5 13–15 i L52: Början på elementära funktioner, kapitel 6 i **K**.

Övning 6 tis 4/5 15–17 i L52: Räkna talen 16a, 16b, 22, 25a, 25c i **EK**.

Lektion 20 ons 5/5 10–12 i L52: Fortsättning på elementära funktioner, kapitel 6 i **K**.

Lektion 21 tor 6/5 10–12 i L52: Flertydiga funktioner, kapitel 7 i **K**.

Övning 7 tor 6/5 13–15 i L52: Räkna talen 25a, 25e, 29, 31, 32 i **EK**.

Lektion 22 mån 10/5 13–15 i L52: Laplaces ekvation och konforma avbildningar, kapitel 9 i **K**.

Lektion 23 ons 12/5 10–12 i L52: Möbiusfunktionen, kapitel 10 i **K**. Läxtal i **EK**: 39, 40, 43.

KS 3 på kapitlen 1–7 i K ons 12/5 13–15 i Q31 och Q33 (INTE V34).

Lektion 24 mån 17/5 13–15 i L52: Konforma avbildningar, kapitel 11 i **K**. Läxtal i **EK**: 46, 48, 50.

Lektion 25 ons 19/5 10–12 i L52: Början på randvärdesproblem, kapitel 12 i **K**. Läxtal i **EK**: 55, 57.

Lektion 26 ons 19/5 13–16 i V34: Fortsättning på randvärdesproblem, kapitel 12 i **K** samt repetition. Läxtal i **EK**: 59, 61.

Lektion 27 tor 20/5 10–12 i L52: Repetition.

Tentamen fre 28/5 14–19, preliminärt i V32–V35.