

KTH Matematik  
Examinator: Lars Filipsson

### Lösningförslag till Tentamen i SF1612 Matematik baskurs 10/10 2007

Inga hjälpmedel. Samtliga uppgifter poängsätts med maximalt 4 poäng vardera.

Uppgifterna 1-3 svarar mot varsin kontrollskrivning. Godkänt på kontrollskrivning nummer  $j$  ger automatiskt 4 poäng på uppgift  $j$  (som då inte ska lösas).

Uppgifterna 4-6 tar upp grundläggande kunskaper och färdigheter.

Uppgifterna 7-9 är mer avancerade. Den som vill ha betyg C eller högre måste samla ett antal poäng på dessa uppgifter, sk VG-poäng.

Preliminära betygsgränser: A - 31 poäng varav minst 8 VG-poäng, B - 26 poäng varav minst 6 VG-poäng, C - 21 poäng varav minst 2 VG-poäng, D - 16 poäng, E - 15 poäng, Fx - 13 poäng. Lycka till!!

—————Uppgifter som motsvarar varsin KS—————

1. Avgör för vilka reella tal  $x$  olikheten  $\frac{x+3}{x+2} \leq x-1$  gäller.

Lösning: Vi sätter på samma bråkstreck och ser att

$$\frac{x+3}{x+2} \leq x-1 \iff \frac{x+3}{x+2} - \frac{(x-1)(x+2)}{x+2} \leq 0 \iff \frac{5-x^2}{x+2} \leq 0.$$

Teckenstudium ger att denna olikhet är uppfylld om och endast om  $-\sqrt{5} \leq x < -2$  eller  $x \geq \sqrt{5}$ .

Svar:  $-\sqrt{5} \leq x < -2$  eller  $x \geq \sqrt{5}$ .

2. Finn alla reella lösningar  $x$  till ekvationen  $\ln x + 2 \ln 2x + 3 \ln 3 = 4 \ln 4$ .

Lösning: Vi observerar först att ekvationen bara är definierad då  $x > 0$ . För sådana  $x$  kan vi använda loglagar och potenslagar och få att ekvationen är ekvivalent med ekvationen  $\ln x + 2 \ln 2 + 2 \ln x = 4 \ln 4 - 3 \ln 3$  vilket i sin tur är ekvivalent med ekvationen  $3 \ln x = 3(\ln 4 - \ln 3)$  som till sist är ekvivalent med att  $\ln x = \ln \frac{4}{3}$  vilket efter exponentiering ger att  $x = 4/3$ .

SVar:  $x = 4/3$

3. Beräkna  $\sin\left(\arctan\frac{1}{3}\right)$  och  $\tan\left(\arccos\frac{7\pi}{6}\right)$ .

Lösning och svar: Vi ser direkt via definitionerna och enhetscirkeln att  $\sin\left(\arctan\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{\sqrt{10}}$ .

Eftersom definitionsmängden till arccos-funktionen är  $[-1, 1]$  och  $7\pi/6 > 1$  så är  $\tan(\arccos(7\pi/6))$  inte definierat.

————— G-uppgifter —————

4. Lös ekvationen  $\sin 2x = \sin x$ . Avgör också om någon eller några av lösningarna ligger i intervallet  $\left[-\frac{7\pi}{12}, -\frac{\pi}{6}\right]$ .

Lösning: Eftersom  $\sin 2x = 2\sin x \cos x$  kan ekvationen i uppgiften skrivas om till  $2\sin x \cos x = \sin x$  som är ekvivalent med att  $\sin x = 0$  eller  $\cos x = 1/2$ .  $\sin x = 0$  har lösningarna  $x = n\pi$ ,  $n$  godtyckligt heltal, och  $\cos x = 1/2$  har lösningarna  $x = \pm\pi/3 + n2\pi$ ,  $n$  godtyckligt heltal. Av dessa lösningar ligger precis en, nämligen  $x = -\pi/3$  i det specificerade intervallet.

Svar: Ekvationen har lösningarna  $x = \pm\pi/3 + n2\pi$  ( $n$  godtyckligt heltal) och  $x = n\pi$  ( $n$  godtyckligt heltal). Av dessa lösningar ligger precis en, nämligen  $x = -\pi/3$  i det specificerade intervallet.

5. Finn alla reella tal  $x$  som löser ekvationen  $|2x + 3| - |3x - 1| = 1$ .

Lösning: Vi delar upp lösningen i tre olika fall.

Fall 1. Om  $x \geq 1/3$  så är  $|2x + 3| - |3x - 1| = 1$  ekvivalent med ekvationen  $2x + 3 - (3x - 1) = 1$  som har lösningen  $x = 3$  vilken ligger i det aktuella intervallet.

Fall 2. Om  $-3/2 \leq x < 1/3$  så är  $|2x + 3| - |3x - 1| = 1$  ekvivalent med ekvationen  $2x + 3 + 3x - 1 = 1$  som har lösningen  $x = -1/5$  vilken ligger i det aktuella intervallet.

Fall 3. Om  $x < -3/2$  så är  $|2x + 3| - |3x - 1| = 1$  ekvivalent med ekvationen  $-2x - 3 + 3x - 1 = 1$  som har lösningen  $x = 5$  vilken ligger utanför det aktuella intervallet.

Svar: Ekvationen har lösningarna  $x = 3$  och  $x = -1/5$ .

6. Avgör om det finns någon konstant term (dvs en term som är oberoende av  $x$ ) i utvecklingen av  $\left(2x^4 - \frac{1}{2x^3}\right)^{14}$ . Beräkna i så fall denna konstanta term och ge svaret på formen  $a/b$  där  $a$  och  $b$  är heltal och bråket är förkortat så långt som möjligt.

Lösning: Binomialsatsen ger att

$$\left(2x^4 - \frac{1}{2x^3}\right)^{14} = \sum_{k=0}^{14} \binom{14}{k} (2x^4)^{14-k} \left(-\frac{1}{2x^3}\right)^k$$

och vi ser att vi får en konstant term precis när  $k = 8$ . Denna term är

$$\binom{14}{8} (2x^4)^6 \left(-\frac{1}{2x^3}\right)^8 = (-1)^8 \frac{14!2^6}{8!6!2^8} = \frac{3003}{4}.$$

Svar:  $\frac{3003}{4}$

—————VG-uppgifter—————

7. Bestäm alla komplexa tal  $z$  som löser ekvationen  $z^6 = 27$ . Svar ska ges på formen  $a + ib$ .

Lösning: Vi skriver på polär form  $z = re^{iv}$  och  $27 = 27e^{n2\pi i}$ , där  $n$  är ett godtyckligt heltal. Ekvationen övergår i  $r^6 e^{i6v} = 27e^{n2\pi i}$  vilket är ekvivalent med att  $r^6 = 27$  och  $6v = n2\pi$  varur följer att  $r = \sqrt[6]{27} = \sqrt{3}$  och  $v = n\pi/3$ ,  $n$  godtyckligt heltal. Dessa lösningar skriver vi nu på rektangulär form:

$$n = 0 \text{ ger lösningen } z_0 = \sqrt{3}$$

$$n = 1 \text{ ger lösningen } z_1 = \sqrt{3}e^{i\pi/3} = \sqrt{3}/2 + i3/2$$

$$n = 2 \text{ ger lösningen } z_2 = \sqrt{3}e^{i2\pi/3} = -\sqrt{3}/2 + i3/2$$

$$n = 3 \text{ ger lösningen } z_3 = \sqrt{3}e^{i3\pi/3} = -\sqrt{3}$$

$$n = 4 \text{ ger lösningen } z_4 = \sqrt{3}e^{i4\pi/3} = -\sqrt{3}/2 - i3/2$$

$$n = 5 \text{ ger lösningen } z_5 = \sqrt{3}e^{i5\pi/3} = \sqrt{3}/2 - i3/2$$

Och detta är alla lösningar för  $n = 6$  ger samma lösning som  $n = 0$  och övriga värden på  $n$  upprepar sedan ovanstående lösningar.

Svar: Lösningarna är  $z = \pm\sqrt{3}$  och  $z = \pm\sqrt{3}/2 \pm i3/2$

8. Formulera och bevisa factorsatsen.

Lösning: Se boken sid 52-53

9. Avgör om det är sant att

$$|x| \leq 1 \implies \cos(2 \arccos x) = 2x^2 - 1.$$

Om det är sant, bevisa det. Om det är falskt, kom med ett motbevis.

Lösning: Antag att  $|x| \leq 1$ . Det betyder  $x$  tillhör definitionsmängden till arccos-funktionen. Använder vi den trigonometriska formeln  $\cos 2u = \cos^2 u - \sin^2 u$  med vinkeln  $u = \arccos x$  får vi att

$$\cos(2 \arccos x) = \cos^2(\arccos x) - \sin^2(\arccos x) = x^2 - (\sqrt{1 - x^2})^2 = 2x^2 - 1.$$

Att påståendet i uppgiften är sant har vi därmed bevisat.