

1) Vi har påståendena:

A: "Minst en av C och mig är kung."

B: "A och C är olika sorter."

C: "A är kung."

Om C är kung är det hon säger sant, så A är också kung. Om C är narr ljuger hon, så A är också narr. **A och C är alltså samma sort.**

B påstår motsatsen, så **B är narr.**

Om A och C är kungar, är A:s utsaga sann. Om de båda är narrar, är den falsk. Det "stämmer" i båda fallen, så mer än ovanstående kan vi inte säkert säga.

**Svar: A och C är samma sort och B är narr.**

Formellt: Om A är påståendet att A är kung och motsvarande för B, C, vet vi att  $A \leftrightarrow (C \vee A)$ ,  $B \leftrightarrow \sim(A \leftrightarrow C)$ ,  $C \leftrightarrow A$  är sanna. T.ex. sanningsvärdestabell ger svaret.

(A:s uttalande är tydligen "onödigt", det ger ingen mer information, men detta måste förstas kontrolleras.)

2) Att visa:  $A \vee C, (A \& B) \rightarrow C \vdash \sim C \rightarrow \sim B$ .

Idé: Antag  $\sim C$  och visa  $\sim B$ , genom att anta B och få C både med A och C, motsägelse ( $\vee E$ ).

1	(1)	$A \vee C$		premiss
2	(2)	$(A \& B) \rightarrow C$		premiss
3	(3)	$\sim C$		antagande
4	(4)	B		antagande
5	(5)	A		antagande
4,5	(6)	$A \& B$	5,4	&I
2,4,5	(7)	C	2,6	$\rightarrow E$
8	(8)	C		antagande
1,2,4	(9)	C	1,5,7,8,8	$\vee E$
1,2,3,4	(10)	$\wedge$	3,9	$\sim E$
1,2,3	(11)	$\sim B$	4,10	$\sim I$
1,2	(12)	$\sim C \rightarrow \sim B$	3,11	$\rightarrow I$

Slutsatsen på rad (12) beror bara av premisserna på raderna (1) och (2), **saken är klar.**

3) För att visa att  $Fa \rightarrow \forall x Gx \not\equiv \exists x Fx \rightarrow \exists x Gx$  skall vi finna en tolkning som gör premissen sann och den tänkta slutsatsen falsk.

$\exists x Fx \rightarrow \exists x Gx$  är falsk precis om  $\exists x Fx$  är sann och  $\exists x Gx$  är falsk. Då är också  $\forall x Gx$  falsk, så för att  $Fa \rightarrow \forall x Gx$  skall vara sann måste Fa vara falsk. Vi leds till tolkningen härintill. Den gör ju Fa,  $\forall x Gx$ ,  $\exists x Gx$  falska och  $\exists x Fx$  sann, så **påståendet följer** enligt ovan.

	F	G
$\alpha$	-	-
$\beta$	+	-

4) För att avgöra om  $\forall x (Fx \rightarrow \forall y Gy) \models \forall x (Fa \rightarrow Gx)$  söker vi motexempel (tolkningar som gör premissen sann och slutsatsen falsk):

I tablån växlar de tre faserna:	$\mathbb{T} : \forall x (Fx \rightarrow \forall y Gy) \quad a_2, b_3$	
	$\mathbb{F} : \forall x (Fa \rightarrow Gx) \quad \sqrt{1:b}$	
1. Satslogiska -; 4-6	$1\mathbb{F} : Fa \rightarrow Gb \quad \sqrt{4}$	
2. $\mathbb{T}\exists, \mathbb{F}\forall \quad 1; -$	$2\mathbb{T} : Fa \rightarrow \forall y Gy \quad \sqrt{5}$	
3. $\mathbb{T}\forall, \mathbb{F}\exists \quad 2,3; 7,8$	$3\mathbb{T} : Fb \rightarrow \forall y Gy \quad \sqrt{6}$	
	$4\mathbb{T} : Fa$	
	$4\mathbb{F} : Gb$	
	└──────────────────┬──────────────────┘	
	$5\mathbb{F} : Fa \quad \times$	$5\mathbb{T} : \forall y Gy \quad a_7, b_8$
		└──────────┬──────────┘
	$6\mathbb{F} : Fb$	$6\mathbb{T} : \forall y Gy$
Tablån sluter sig, så <b>slutledningen är giltig.</b>	$7\mathbb{T} : Ga$	$7\mathbb{T} : Ga$
	$8\mathbb{T} : Gb$	$8\mathbb{T} : Gb$
	$\times$	$\times$

5) 1. "Varje pojke litar på någon annan pojke."

dvs "För alla  $x$ : om  $x$  är pojke finns  $y$  så att  $y$  är pojke,  $x$  och  $y$  är olika och  $x$  litar på  $y$ ",  
 så svar:  $\forall x (Px \rightarrow \exists y (Py \ \& \ x \neq y \ \& \ Lxy))$

(mer precist:  $\forall x (Px \rightarrow \exists y ((Py \ \& \ \sim x = y) \ \& \ Lxy))$ )

2. "Det finns en flicka som litar på precis dem som litar på någon pojke."

dvs "Det finns  $x$  så att  $x$  är flicka och för alla  $y$  gäller att  $x$  litar på  $y$  precis om (omm) det finns  $z$  så att  $z$  är pojke och  $y$  litar på  $z$ "


så svar:  $\exists x (Fx \ \& \ \forall y (Lxy \leftrightarrow \exists z (Pz \ \& \ Lyz)))$

Logiskt ekvivalenta varianter är förstås möjliga.

6) Uttryckt i "punkter och pilar" säger  $p_1 : \forall x \forall y ((Pxy \ \& \ Pyx) \rightarrow x = y)$  att det inte finns andra dubbelriktade pilar än loopar (dvs pilar från punkter till sig själva),  $p_2 : \forall x \exists y Pxy$  säger att minst en pil startar i varje punkt,  $p_3 : \exists x \forall y Pxy$  säger att det finns en punkt med pilar till alla punkter (inklusive den själv) och  $q : \forall x Pxx \vee \forall x \sim Pxx$  säger att det finns minst en punkt utan någon loop och minst en punkt med.

Vi visar  $p_1, p_2, p_3 \not\models q$  genom att finna en tolkning som gör  $p_1, p_2$  och  $p_3$  sanna och  $q$  falsk.

Enligt  $p_3$  innehåller domänen  $D$  i den sökta tolkningen ett element  $\alpha$  med pilar till alla, dvs  $Paa, Pab, \dots$  sanna. Eftersom  $q$  är falsk finns ett element utan loop, kalla det  $\beta$ .  $p_1$  förbjuder  $Pba$  och  $p_2$  kräver en pil från  $\beta$ . Det finns alltså minst ett element till,  $\gamma$ , med  $Pbc$  sann. Enligt  $p_2$  finns en pil från  $\gamma$ .  $Pca$  och  $Pcb$  förbjuds av  $p_1$ , men  $Pcc$  går bra. Detta ger tolkningen (se figuren)



$D = \{\alpha, \beta, \gamma\}$ ,  $\text{Ext}(P) = \{\langle \alpha, \alpha \rangle, \langle \alpha, \beta \rangle, \langle \alpha, \gamma \rangle, \langle \beta, \gamma \rangle, \langle \gamma, \gamma \rangle\}$ .

Den gör  $p_1, p_2, p_3$  sanna och  $q$  falsk, så **saken är klar**.

7) Att visa:  $\exists x Fx, \exists x (Fx \rightarrow Gx), \forall x \sim Gx \vdash \exists x \exists y x \neq y$ .


Idé:  $Fa$  gäller för något  $a$  och  $Fb \rightarrow Gb$  för något  $b$ . Om  $a = b$  gällde skulle  $Gb$  gälla, men det motsäger  $\forall x \sim Gx$ . Det behövs tydligen  $\exists E$  två gånger.

1	(1)	$\exists x Fx$		premiss
2	(2)	$\exists x (Fx \rightarrow Gx)$		premiss
3	(3)	$\forall x \sim Gx$		premiss
4	(4)	$Fa$		antagande
5	(5)	$Fb \rightarrow Gb$		antagande
6	(6)	$a = b$		antagande
4,6	(7)	$Fb$	6,4	=E
4,5,6	(8)	$Gb$	5,7	$\rightarrow E$
3	(9)	$\sim Gb$	3	$\forall E$
3,4,5,6	(10)	$\wedge$	9,8	$\sim E$
3,4,5	(11)	$a \neq b$	6,10	$\sim I$
3,4,5	(12)	$\exists y a \neq y$	11	$\exists I$
3,4,5	(13)	$\exists x \exists y x \neq y$	12	$\exists I$
2,3,4	(14)	$\exists x \exists y x \neq y$	2,5,13	$\exists E$ [b inte i (2),(13),(3),(4)]
1,2,3	(15)	$\exists x \exists y x \neq y$	1,4,14	$\exists E$ [a inte i (1),(14),(2),(3)]

Slutsatsen på rad (15) beror bara av premisserna på rad (1), (2) och (3), **saken är klar**.

8) En binär relation  $\mathcal{R}$  som gör  $\forall x \forall y (Rxy \rightarrow (Ryx \ \& \ Ryy)) \ \& \ \forall x \exists y Rxy$  sann är

- **symmetrisk**, dvs  $\forall x \forall y (Rxy \rightarrow Ryx)$  är sann, ty för godtyckliga  $a$  och  $b$  ger  $\forall x \forall y (Rxy \rightarrow (Ryx \ \& \ Ryy))$  att  $Rab \rightarrow (Rba \ \& \ Rbb)$ , så om  $Rab$  är sann är också  $Rba \ \& \ Rbb$  det och speciellt  $Rba$ , således  $Rab \rightarrow Rba$
- **reflexiv**, dvs  $\forall x Rxx$  är sann, ty  $\forall x \exists y Rxy$  ger att det för godtyckligt  $a$  finns  $c$  så att  $Rac$ , enligt symmetrin då också  $Rca$ , och som nyss gäller  $Rca \rightarrow (Rac \ \& \ Raa)$ , således  $Rac \ \& \ Raa$ , speciellt  $Raa$
- **inte (säkert) transitiv**, dvs  $\forall x \forall y \forall z ((Rxy \ \& \ Ryz) \rightarrow Rxz)$  behöver inte vara sann, vilket ses av tolkningen (se figuren)  
 $D = \{\alpha, \beta, \gamma\}$   $\text{Ext}(P) = \{\langle \alpha, \alpha \rangle, \langle \alpha, \beta \rangle, \langle \beta, \alpha \rangle, \langle \beta, \beta \rangle, \langle \beta, \gamma \rangle, \langle \gamma, \beta \rangle, \langle \gamma, \gamma \rangle\}$ .  
 Den gör den givna sentensen sann, men inte  $(Rab \ \& \ Rbc) \rightarrow Rac$



Svar:  $\mathcal{R}$  är reflexiv och symmetrisk, men inte säkert transitiv.

9) Vi har:  $\alpha) \sim p \neq q$   $\beta) \neq p$  och  $\neq q$ .

$\alpha)$  betyder precis att det finns minst en tolkning som gör  $\sim p$  sann, dvs  $p$  falsk, och  $q$  falsk.

$\beta)$  betyder precis att det finns minst en tolkning som gör  $p$  falsk och minst en tolkning (inte säkert samma) som gör  $q$  falsk.

Tydiligen gäller  $\alpha \Rightarrow \beta$  (till och med samma tolkning gör  $p$  och  $q$  falska).

Exemplet  $p : A$ ,  $q : \sim A$ , som gör  $\beta)$  sann ( $\neq A$  och  $\neq \sim A$  gäller) men  $\alpha)$  falsk ( $\sim A \models \sim A$  gäller) visar att  $\beta) \not\Rightarrow \alpha)$ .

Så svar:  $\alpha) \Rightarrow \beta)$ ,  $\beta) \not\Rightarrow \alpha)$ .

10) Låt  $\phi x$  vara formeln  $S(0) * x = x$ . Vi skall visa  $\forall x \phi x$ .

$\phi 0$  gäller eftersom  $S(0) * 0 \stackrel{P5}{=} 0$ .

Antag att  $\phi a$  gäller, dvs  $S(0) * a = a$ .

Då fås  $S(0) * S(a) \stackrel{P6}{=} (S(0) * a) + S(0) \stackrel{\phi a}{=} a + S(0) \stackrel{P4}{=} S(a + 0) \stackrel{P3}{=} S(a)$ , dvs  $\phi S(a)$ .

Därmed gäller  $\phi a \rightarrow \phi S(a)$  för alla  $a$ , så  $\forall x (\phi x \rightarrow \phi S(x))$ .

Så  $\phi 0 \& \forall x (\phi x \rightarrow \phi S(x))$  gäller och enligt axiom P7 (med  $n = 0$ ) gäller då  $\forall x \phi x$ , dvs

**det önskade  $\forall x S(0) * x = x$  är visat.**

11) Vi skall visa att  $\Diamond A \rightarrow \Box A \vdash_{S5} \sim A \rightarrow \Box \sim A$ .

Idé: Antag att  $\sim A$  gäller i den verkliga världen. Om  $\Diamond A$  gällde skulle premissen ge  $\Box A$  och då  $A$  i varje värld, speciellt den verkliga, motsägelse, så  $\sim \Diamond A$  gäller. Ur den kan vi som vanligt härleda  $\Box \sim A$ , **men** härledningen kräver fullt modaliserade förutsättningar, vilket  $\sim A$  inte är. Vi får anta något vi vet, härleda en implikation etc.

1	(1)	$\Diamond A \rightarrow \Box A$	premiss	
2	(2)	$\sim A$	antagande	
3	(3)	$\Diamond A$	antagande	
1,3	(4)	$\Box A$	1,3 $\rightarrow E$	
1,3	(5)	$A$	4 $\Box E$	
1,2,3	(6)	$\wedge$	2,5 $\sim E$	
1,2	(7)	$\sim \Diamond A$	3,6 $\sim I$	
8	(8)	$\sim \Diamond A$	antagande	
9	(9)	$A$	antagande	
9	(10)	$\Diamond A$	9 $\Diamond I$	
8,9	(11)	$\wedge$	8,10 $\sim E$	
8	(12)	$\sim A$	9,11 $\sim I$	
8	(13)	$\Box \sim A$	12 $\Box I$	[(8) fullt modaliserad]
	(14)	$\sim \Diamond A \rightarrow \Box \sim A$	8,13 $\rightarrow I$	
1,2	(15)	$\Box \sim A$	14,7 $\rightarrow E$	
1	(16)	$\sim A \rightarrow \Box \sim A$	2,15 $\rightarrow I$	

Slutsatsen på sista raden beror bara av premissen på rad (1), så **saken är klar**.

12) Vi skall visa att  $\Box \forall x \forall y Pxy \not\equiv_{S5} \Diamond \forall x \Box \forall y Pxy$ .

Vi söker alltså en tolkning som gör premissen sann och den tänkta slutsatsen falsk.

Premissen sann ger att  $\forall x \forall y Pxy$  är sann i varje värld, dvs i varje värld står alla existerande element i relationen  $P$  till varandra.

$\Diamond \forall x \Box \forall y Pxy$  falsk ger att inte i någon värld är  $\forall x \Box \forall y Pxy$  sann, dvs i varje värld finns ett element,  $a$  säg, så att det finns någon värld med ett existerande element,  $b$  säg, där  $Pab$  är falsk.  $a$  kan tydligen inte existera i den senare världen.

Tolkning:  $\mathcal{W} = \{w^*, u\}$ ,  $D = \{\alpha, \beta\}$ ,  $w^*(D) = \{\alpha\}$ ,  $u(D) = \{\beta\}$ ,

$w^*[P] = \{\langle \alpha, \alpha \rangle\}$ ,  $u[P] = \{\langle \beta, \beta \rangle\}$ .

Den **visar att  $\Box \forall x \forall y Pxy \not\equiv_{S5} \Diamond \forall x \Box \forall y Pxy$  ty:**

- $\Box \forall x \forall y Pxy$  är **sann**, ty  $w^*[\Box \forall x \forall y Pxy] = 1$ ,  
 ty  $w^*[\forall x \forall y Pxy] = 1$  (ty  $w^*(D) = \{\alpha\}$  och  $w^*[Paa] = 1$ , ty  $\langle \alpha, \alpha \rangle \in w^*[P]$ )  
 och  $u[\forall x \forall y Pxy] = 1$  (ty  $u(D) = \{\beta\}$  och  $u[Pbb] = 1$ , ty  $\langle \beta, \beta \rangle \in u[P]$ )
- $\Diamond \forall x \Box \forall y Pxy$  är **falsk**, ty  $w^*[\Diamond \forall x \Box \forall y Pxy] = 0$ ,  
 ty  $w^*[\forall x \Box \forall y Pxy] = 0$  (ty  $\alpha \in w^*(D)$  och  $w^*[\Box \forall y P\alpha y] = 0$ ,  
 ty  $u[\forall y P\alpha y] = 0$ , ty  $\beta \in u(D)$  och  $u[Pab] = 0$ , ty  $\langle \alpha, \beta \rangle \notin u[P]$ )  
 och  $u[\forall x \Box \forall y Pxy] = 0$  (ty  $\beta \in u(D)$  och  $u[\Box \forall y P\beta y] = 0$ ,  
 ty  $w^*[\forall y P\beta y] = 0$ , ty  $\alpha \in w^*(D)$  och  $w^*[Pba] = 0$ , ty  $\langle \beta, \alpha \rangle \notin w^*[P]$ )

**13)** Vi skall visa att  $A \rightarrow (B \vee \sim C) \vDash_I \sim B \rightarrow \sim (A \& C)$ .

Låt som vanligt  $S$  vara mängden av informationstillstånd, med rot  $\alpha$  och ordning  $\leq$ , i en intuitionistisk tolkning.


Antag att  $\alpha \Vdash A \rightarrow (B \vee \sim C)$ . Om vi då visar att  $\alpha \Vdash \sim B \rightarrow \sim (A \& C)$  är saken klar. Det gäller alltså att visa att om  $\sigma \Vdash \sim B$  för något  $\sigma \in S$  så gäller också  $\sigma \Vdash \sim (A \& C)$ , dvs att för alla  $\tau \in S$  med  $\sigma \leq \tau$  gäller  $\tau \not\Vdash A \& C$ , dvs  $\tau \not\Vdash A$  eller  $\tau \not\Vdash C$ . Men om  $\tau \Vdash A$ , gäller, eftersom vi antagit  $\alpha \Vdash A \rightarrow (B \vee \sim C)$ , att  $\tau \Vdash B \vee \sim C$ , dvs  $\tau \Vdash B$  eller  $\tau \Vdash \sim C$ . Eftersom  $\sigma \Vdash \sim B$  med  $\sigma \leq \tau$  gäller  $\tau \not\Vdash B$ , så  $\tau \Vdash \sim C$ , vilket medför  $\tau \not\Vdash C$ . Således  $\tau \not\Vdash A$  eller  $\tau \not\Vdash C$  och **saken är klar**, vi har visat  $A \rightarrow (B \vee \sim C) \vDash_I \sim B \rightarrow \sim (A \& C)$ .

**14)** Vi skall visa att  $\sim \exists x (Fx \& Gx) \not\equiv_I \forall x (\sim Fx \vee \sim Gx)$  genom att finna en tolkning så att  $\alpha \Vdash \sim \exists x (Fx \& Gx)$  och  $\alpha \not\Vdash \forall x (\sim Fx \vee \sim Gx)$ .

För att visa motsvarande (riktiga) logiska följd i klassisk logik, använder man  $\sim \exists x Px \vDash \forall x \sim Px$  och  $\sim (A \& B) \vDash \sim A \vee \sim B$ . I intuitionistisk logik gäller den första men inte den andra av dessa. Vi "använder" alltså den andra för att finna den sökta tolkningen.

Betrakta tolkningen (se fig.)  $S = \{\alpha, \beta, \gamma\}$ ,  $\leq = \{\langle \alpha, \beta \rangle, \langle \alpha, \gamma \rangle\}$ ,  $dom(\alpha) = dom(\beta) = dom(\gamma) = \{\odot\}$ ,

$warr(\alpha) = \emptyset$ ,  $warr(\beta) = \{\langle 'F', \odot \rangle\}$ ,  $warr(\gamma) = \{\langle 'G', \odot \rangle\}$ .



Den ger:

- $\alpha \Vdash \sim \exists x (Fx \& Gx)$ , ty  $\alpha, \beta, \gamma \not\Vdash \exists x (Fx \& Gx)$ , ty  $\alpha, \beta, \gamma \not\Vdash F\odot \& G\odot$ , ty  $\alpha, \beta \not\Vdash G\odot$ ,  $\alpha, \gamma \not\Vdash F\odot$  och  $dom(\alpha) = dom(\beta) = dom(\gamma) = \{\odot\}$
- $\alpha \not\Vdash \forall x (\sim Fx \vee \sim Gx)$ , ty  $\alpha \not\Vdash \sim F\odot \vee \sim G\odot$ , ty  $\alpha \not\Vdash \sim F\odot$  (ty  $\beta \Vdash F\odot$ ) och  $\alpha \not\Vdash \sim G\odot$  (ty  $\gamma \Vdash G\odot$ ) och  $\odot \in dom(\alpha)$

Så **saken är klar**.

**15)** En modell för  $\Gamma_n$  ( $\Gamma_\infty$ ) som gör  $q$  sann är precis en modell för  $\Gamma_n \cup \{q\}$  ( $\Gamma_\infty \cup \{q\}$ ).

Enligt kompakthetsatsen har  $\Gamma_\infty \cup \{q\}$  en modell precis om varje ändlig delmängd,  $\Gamma'$ , av den har en modell. Men för varje sådant  $\Gamma'$  finns ett största  $k$  så att  $p_k \in \Gamma'$ . Det betyder att  $\Gamma' \subset \Gamma_n \cup \{q\}$  då  $n > k$ . Eftersom det finns en modell för  $\Gamma_n \cup \{q\}$  för oändligt många  $n$  finns det en med  $n > k$  och alltså en modell för  $\Gamma'$ . **Påståendet följer**.

**16)** Den givna sentensen  $\exists u \exists X \forall x ((Xx \leftrightarrow \sim Xu(u(x))) \& \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y))$  är sann i en tolkning (dvs för en viss domän  $D$ ) precis om sentensen i första ordningens logik  $\forall x ((Px \leftrightarrow \sim Pf(f(x))) \& \forall y (f(x) = f(y) \rightarrow x = y))$  är sann för någon tolkning av funktionssymbolen  $f$  och predikatsymbolen  $P$ .

Låt  $\alpha_0 \in D$  avbildas av  $Ref(f) : D \rightarrow D$  enligt  $\alpha_0 \mapsto \alpha_1 \mapsto \alpha_2 \dots$ . Eftersom  $D$  är ändlig måste denna följd innehålla någon upprepning, låt  $l$  vara det minsta talet så att  $\alpha_l = \alpha_k$  för något  $k < l$ . Men  $\forall x \forall y (f(x) = f(y) \rightarrow x = y)$  är sann, så  $k = 0$  (annars vore  $\alpha_{k-1} = \alpha_{l-1}$ , dvs  $l$  inte minimalt) och  $\alpha_0$  ingår i en sluten kedja (en **cykel**) under  $Ref(f)$ :s verkan.  $\alpha_0$  var godtyckligt, så hela  $D$  delas in i sådana cykler.

Eftersom  $\forall x (Px \leftrightarrow \sim Pf(f(x)))$  är sann, gäller  $\alpha_i \in Ext(P) \Leftrightarrow \alpha_{i+2} \notin Ext(P)$ . Det betyder att i hela cykeln kommer omväxlande två element i  $Ext(P)$ , två element i  $D \setminus Ext(P)$ , två element i  $Ext(P)$  etc. För att det skall "gå ihop" måste cykelns längd vara en multipel av 4. Detta skall gälla för alla cykler, så totala antalet element i domänen,  $|D|$ , måste vara en multipel av 4.

**Alternativt** kan man se detta så (kortare, men kanske svårare att komma på): Domänen  $D = D_{11} \cup D_{10} \cup D_{00} \cup D_{01}$ , där  $D_{11}, D_{10}, \dots$  är de disjunkta mängderna  $D_{11} = \{i \in D \mid Pi \text{ och } Pf(i) \text{ sanna}\}$ ,  $D_{10} = \{i \in D \mid Pi \text{ och } \sim Pf(i) \text{ sanna}\}$  etc. Då avbildar  $Ref(f) : D_{11} \rightarrow D_{10} \rightarrow D_{00} \rightarrow D_{01} \rightarrow D_{11}$  och eftersom  $Ref(f)$  avbildar olika element på olika, måste  $|D_{11}| \leq |D_{10}| \leq |D_{00}| \leq |D_{01}| \leq |D_{11}|$ . De fyra mängderna är alltså alla lika stora och resultatet blir som nyss.

Omvänt, om  $|D|$  är en multipel av 4, finner vi tolkningar av  $f$  och  $P$  som gör sentensen ovan sann: Dela in  $D$  i grupper om fyra element, låt  $Ref(f)$  ha alla dessa som cykler och  $Ext(P)$  innehålla precis två i rad i varje cykel. Detta gör tydligen sentensen sann och därmed är den givna andra ordningens sentens sann.

**Svar: Sentensen är sann precis om (den ändliga) domänens antal element är delbart med 4.**