

Matematiska Institutionen  
KTH

**Lösning till lappskrivning nummer 5B till kursen Linjär algebra II, 5B1109,  
för D1 den 22/11-2006, 13.15-13.35.**

Namn:

Personnummer:

Resultat:

Lösningen räknas som godkänd om det mesta är rätt. Godkänd uppgift ger 1 bonuspoäng vid tentamensskrivning på kursen. Detta gäller ordinarie tentamenstillfället och tentamensskrivningar fram till augusti 2007.

**OBS Svaret skall motiveras väl och lösningen skrivs på detta pappers fram- och baksida. Inga hjälpmedel är tillåtna.**

**Problem:**

För en linjär avbildning  $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  gäller att  $T(1, 0) = (1, 3)$  och  $T(0, 1) = (2, 5)$ . Bestäm T:s bildrum och T:s nollrum. **Svar utan motivering blir ej godkänd!**

**Lösning:**

Låt  $A$  beteckna standardmatrisen för  $T$ . Vi har då

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

T:s bildrum spänns upp av kolumnerna i  $A$ , dvs T:s bildrum är  $\text{span}\{(1, 3), (2, 5)\}$ . Eftersom de två vektorerna är linjärt oberoende spänner de upp hela  $\mathbb{R}^2$ , så T:s bildrum är  $\mathbb{R}^2$ .

Dimensionssatsen för linjära avbildningar (sats 8.2.3 i kursboken) ger att dimensionen för bildrummet + dimensionen för nollrummet = 2 (dimensionen för definitionsmängden).

Dimensionen för bildrummet är 2. Därmed är dimensionen för nollrummet 0, och nollrummet måste då vara nollvektorrummet,  $\{\mathbf{0}\}$ .

Alternativt bestämmer man nollrummet till matrisen  $A$ , dvs löser

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Direkt lösning eller undersökning av determinanten ger att endast triviala lösningen  $\mathbf{x} = \mathbf{0}$  finns, vilket också ger att nollrummet till  $T$  är nollvektorrummet,  $\{\mathbf{0}\}$ .

**Svar:** T:s bildrum är  $\mathbb{R}^2$  och T:s nollrum är  $\{\mathbf{0}\}$ .