




KTH Matematik

Tentamen i 5B1816 Tillämpad matematisk programmering—ickelinjära problem
Torsdagen den 16 december 2004 kl. 8.00–13.00
Kortfattade lösningsförslag

1. (a) Nej.
(b) Nej.
(c) Ja.
(d) Ja.
(e) Nej.


2. (Se kursmaterialet.)

3. (a) Iterationsförloppet för de två iterationerna illustreras i nedanstående figur:



I första iterationen pekar sökriktningen på $(0 \ 0)^T$. Steglängden begränsas av bivillkor 1, som blir aktivt. I andra iterationen pekar sökriktningen på $(1 \ 1)^T$, vilket också är tillåtet. Det lönar sig inte att släppa bivillkor 1, och vi är klara.

(b) Iterationsförloppet för de tre iterationerna illustreras i nedanstående figur:



I första iterationen pekar sökriktningen på $(3 \ 0)^T$, som är tillåten. Det lönar sig nu att släppa bivillkor 2. I andra iterationen pekar sökriktningen på $(0 \ 0)^T$. Steglängden begränsas av bivillkor 1, som blir aktivt. I tredje iterationen pekar sökriktningen på $(1 \ 1)^T$, vilket också är tillåtet. Det lönar sig inte att släppa bivillkor 1, och vi är klara.

- (c) Den punkt vi funnit har bivillkoret $x_1 + x_2 \geq 2$ aktivt. Optimalitetsvillkoren ges av

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ -\lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix},$$

vilket har lösning $x = (1 \ 1)^T$, $\lambda_1 = 1$. Då $\lambda_1 \geq 0$ är första ordningens optimalitetsvillkor uppfyllda. Eftersom $H \succ 0$ är den funna punkten en global optimalpunkt.

4. Vi har

$$f(x) = \frac{1}{2}(x_1 - 2)^2 + \frac{1}{2}(x_2 - 3)^2, \quad \nabla f(x) = \begin{pmatrix} x_1 - 2 \\ x_2 - 3 \end{pmatrix}, \quad \nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$g(x) = 1 - \frac{1}{2}x_1^2 - \frac{1}{2}x_2^2, \quad \nabla g(x) = \begin{pmatrix} -x_1 \\ -x_2 \end{pmatrix}, \quad \nabla^2 g(x) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Newtonsteget Δx , $\Delta \lambda$ ges av

$$\begin{pmatrix} \nabla_{xx}^2 \mathcal{L}(x, \lambda) & A(x)^T \\ \Lambda A(x) & -G(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ -\Delta \lambda \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \nabla f(x) - A(x)^T \lambda \\ G(x) \lambda - \mu e \end{pmatrix},$$

där $\Lambda = \text{diag}(\lambda)$ och $G(x) = \text{diag}(g(x))$.

Insättning ger det linjära ekvationssystemet

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ -\Delta \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Lösningen ges av $\Delta x = (-1/7 \ 1)^T$, $\Delta \lambda = -4/7$.

Steglängden α bör bestämmas så att $g(x + \alpha \Delta x) > 0$ och $\lambda + \alpha \Delta \lambda > 0$. Detta gäller för $\alpha = 1$. Om vi, för enkelhets skull, bortser från krav från en meritfunktion och väljer $\alpha = 1$, får vi $x^1 = (6/7 \ 1)^T$ och $\lambda^1 = 10/7$. (Vi har $x(2) \approx (0.5954 \ 0.8931)^T$ och $\lambda(2) \approx 2.3590$.)

5. (a) Om vi bortser från bivillkoret $a^T x = b$ är x^* inte en lokal minpunkt. Då sönderfaller problemet i

$$(P_1) \quad \min \quad \tilde{f}(x_1, x_2) \quad \text{och} \quad (P_2) \quad \min \quad \frac{1}{2}x_3^2 - x_4^2 - x_3 + 2x_4 \\ \text{då} \quad x \in \mathbb{R}^2, \quad \text{då} \quad 2 - \frac{1}{2}x_3^2 - \frac{1}{2}x_4^2 \geq 0.$$

Då $\nabla^2 \tilde{f}(x_1, x_2) \succ 0$ och $\nabla \tilde{f}(1, 1) = 0$ följer att $x_1 = 1$ och $x_2 = 1$ är globalt optimal till (P_1) . Bivillkoret i (P_2) är inaktivt då $x_3 = 1$ och $x_4 = 1$. Därmed är $(1 \ 1)^T$ inte en lokal minpunkt till (P_2) , eftersom gradienten är noll, men Hessianen inte är positivt semidefinit. Om man bortser från bivillkoret är (P_2) ett separabelt problem, där $x_3 = 1$ är global minpunkt till $\min \frac{1}{2}x_3^2 - x_3$, men $x_4 = 1$ inte är en minpunkt till $\min -x_4^2 + 2x_4$. Den negativa krökningen kommer alltså från x_4 , så om vi eliminerar x_4 genom att sätta $x_4 = 1$ blir det resulterande problemet konvext, och $(1 \ 1)^T$ blir en global minpunkt. Sammantaget kan vi låta $a = (0 \ 0 \ 0 \ 1)^T$ och $b = 1$, så blir x^* globalt optimal till det resulterande problemet.

- (b) Vi har ovan sett att x^* inte blir en lokal minpunkt då bivillkoret inte är bindande. Den enda möjligheten är därmed $c = 1$, då bivillkoret blir bindande i x^* . Precis som ovan sönderfaller det i två problem, och endast problemet i x_3 och x_4 är intressant eftersom $x_1 = 1$ och $x_2 = 1$ är global minpunkt till (P_1) . För att förenkla notationen, låt $y_1 = x_3$ och låt $y_2 = x_4$. Då får vi

$$\min \quad \frac{1}{2}y_1^2 - y_2^2 - y_1 + 2y_2 \\ \text{då} \quad 1 - \frac{1}{2}y_1^2 - \frac{1}{2}y_2^2 \geq 0.$$

Låt $y^* = (1 \ 1)^T$. Då blir y^* en reguljär punkt, och för att y^* ska vara en lokal minpunkt måste det finnas icke-negativ λ^* så att $\nabla f(y^*) = \nabla g(y^*)\lambda^*$, dvs

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \lambda^*,$$

vilket ger $\lambda^* = 0$. För att kontrollera andra ordningens nödvändiga villkor, låt $Z^* = (1 \ -1)^T$. Då bildar Z^* en bas för $\text{null}(\nabla g(y^*)^T)$. Vi får

$$Z^{*T} \nabla_{xx}^2 \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) Z^* = \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = -1 < 0.$$

Därmed går andra ordningens nödvändiga optimalitetsvillkor inte att uppfylla, vilket medför att vi inte kan hitta ett värde på c så att x^* blir en lokal minpunkt till det givna problemet.