

## Dagens tema

- Fourierserier (forts) (ZC11.2, 11.3)

Funktioner definerade i godtyckliga  
begränsade intervall

Fourierserier och differentialekvationer

Sinus- resp. cosinusutvecklingar

## Fourierserier

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

Viktig observation:

Summan i högerledet i relationen

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad < x < ,$$

är en  $2\pi$ -periodisk funktion och därför definierad även utanför intervallet  $< x < \pi$  men behöver där inte vara  $= f(x)$ . Sett som funktioner på *hela* reella tallinjen är funktionerna i väster och höger led *olika*.

Skalning av  $x$ -axeln ger: (ZC Def 11.5)

Fourierserier för funktioner  $f(x)$  i intervall  $-p \leq x \leq p$ :

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n}{p} x + b_n \sin \frac{n}{p} x \right),$$

där 
$$a_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \cos \frac{n}{p} x \, dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \sin \frac{n}{p} x \, dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

Allmännare: För  $f(x)$  def i intervall  $I$  av längd  $L$ :

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{2n}{L} x + b_n \sin \frac{2n}{L} x \right),$$


där 
$$a_n = \frac{2}{L} \int_I f(x) \cos \frac{2n}{L} x \, dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{2}{L} \int_I f(x) \sin \frac{2n}{L} x \, dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

# Periodisk fortsättning av funktioner

*Definition:*

Om  $f(x)$  är definierad i intervall av längd  $L$ , så är den  $L$ -periodiska fortsättningen av  $f(x)$ :



$$f_L(x) = f(x - nL), \text{ då } nL \leq x < (n + 1)L, \\ n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

## Konvergenssats (ZC Th 11.1)

Om  $f(x)$  är  $L$ -periodisk, styckvis kontinuerlig och styckvis deriverbar så är (den  $L$ -periodiska) fourierserien för  $f =$

$$\frac{f(x+) + f(x-)}{2}$$

(Detta medelvärde =  $f(x)$  i kontinuitetspunkterna.)

## Utveckling av udda resp jämna funktioner

Fourierserier för *jämna* funktioner  $f(x)$  i  $-p \leq x \leq p$ :

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n}{p} x,$$

där 
$$a_n = \frac{2}{p} \int_0^p f(x) \cos \frac{n}{p} x \, dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Fourierserier för *udda* funktioner  $f(x)$  i  $-p \leq x \leq p$ :

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n}{p} x$$

där 
$$b_n = \frac{2}{p} \int_0^p f(x) \sin \frac{n}{p} x \, dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

## Jämna utvecklingar

”Half-Range Expansions”, ZC sid 443

*Definition:*


Om  $f(x)$  är definierad i intervallet  $0 \leq x \leq p$ , så kallas den  $2p$ -periodiska fortsättningen av:

$$f(x), \text{ då } 0 \leq x \leq p,$$

$$f(-x), \text{ då } -p \leq x \leq 0,$$

den *jämna periodiska fortsättningen* av  $f(x)$ .

Nedan betecknas den  $f_{\text{jämn}}$ .



Fourierserieutvecklingen blir

$$f_{\text{jämn}}(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n}{p} x,$$

där 
$$a_n = \frac{2}{p} \int_0^p f(x) \cos \frac{n}{p} x \, dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Man säger att man utvecklat  $f(x)$ ,  $0 \leq x \leq p$ , i *cosinusserie*.

## Udda utvecklingar


*Definition:*

Om  $f(x)$  är definierad i intervallet  $0 \leq x \leq p$ , så kallas den  $2p$ -periodiska fortsättningen av:

$$\begin{aligned} f(x), & \text{ då } 0 < x < p, \\ -f(-x), & \text{ då } -p < x < 0, \\ 0, & \text{ då } x = np, \end{aligned}$$

den *udda periodiska fortsättningen* av  $f(x)$ .

Nedan betecknas den  $f_{\text{udda}}$ .



Fourierserieutvecklingen blir

$$f_{\text{udda}}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n}{p} x,$$

där 
$$b_n = \frac{2}{p} \int_0^p f(x) \sin \frac{n}{p} x \, dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Man säger att man utvecklat  $f(x)$ ,  $0 \leq x \leq p$ , i *sinusserie*.