

## Dagens teman

- Linjära ODE av godtycklig ordning med konstanta koefficienter. Homogena. (ZC4.3)
- Linjära ODE av godtycklig ordning med konstanta koefficienter. Inhomogena. Variation-av-parametermetoden. (ZC4.6)

## Linjära ODE av godtycklig ordning: ZC 4.1

$$\begin{aligned} y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y &= \\ &= g(x). \quad \text{Allmänna fallet,} \quad (\text{A}) \\ &= 0. \quad \text{Homogena fallet,} \quad (\text{H}) \end{aligned}$$

### Superpositionsegenskaper:

- $y_1$  och  $y_2$  lösningar till (H)  
 $y = c_1y_1 + c_2y_2$  lösningar till (H) för godtyckliga konstanter  $c_1$  och  $c_2$ .
- $y_1$  och  $y_2$  lösningar till (A)  
 $y = y_1 - y_2$  lösning till (H).
- Om (H) har *reella* koefficienter:  
 $y = u + iv$  ( $u$  och  $v$  reella) en komplex lösning till (H)  
 $u$  och  $v$  lösningar till (H).

## Lösningmängdernas struktur:

- Allmän lösning till (H):

$$y_h = c_1y_1 + c_2y_2 + \dots + c_ny_n,$$

där  $y_1, y_2, \dots, y_n$  är  $n$  st *linjärt oberoende* lösningar till (H) och där  $c_1, c_2, \dots, c_n$  är godtyckliga konstanter.

- Allmän lösning till (A):

$$y = y_p + y_h$$

där  $y_p$  är någon (vilken som helst) lösning till (A) och  $y_h$  är den allmänna lösningen till motsvarande homogena ekvation.

## Wronskis testförfarande

Om  $n$  st funktioner

$$y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x),$$

alla är lösningar till ekvationen

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = 0,$$

där  $a$ :na är kontinuerliga funktioner av  $x$  i ett intervall  $I$ ,

så är de linjärt oberoende i detta intervall om och endast om determinanten

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ y_1' & y_2' & \dots & y_n' \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix} \neq 0,$$

för något  $x$  i intervallet.

## För ekvationer med konstanta koefficienter:

### ZC 4.3

- Karakteristisk ekvation ("Auxiliary Equation"):

$$m^n + a_{n-1}m^{(n-1)} + \dots + a_1m + a_0 = 0. \quad (\text{K})$$

- Rötternas relation till ODE:ns lösningar:  
Om  $m_0$  är en rot med multiplicitet  $k$  till (K) så är

$$y = q(x) \cdot e^{m_0 x},$$

där  $q$  är ett godtyckligt polynom av grad högst  $k - 1$ , lösning till (H).

- Den allmänna lösningen till (H) erhålls genom att man summerar alla lösningarna, som enligt föregående punkt finns för de olika rötterna till (K).

## Variation-av-parameter-metoden ZC 4.6

*Lösning av inhomogen ekvation med hjälp av den fullständiga lösningen till motsvarande homogena ekvation.*

Låt

$$y_h = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n$$

vara den allmänna lösningen till

$$y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = 0.$$

Väljer man funktioner

$$u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x),$$

så att

$$\begin{array}{cccccc} y_1 & y_2 & \dots & y_n & u_1'(x) & 0 \\ y_1' & y_2' & \dots & y_n' & u_2'(x) & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} & u_n'(x) & f(x) \end{array} = \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ f(x) \end{array},$$

så kommer

$$y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2 + \dots + u_n y_n$$

att vara en partikulärlösning till

$$y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = f(x).$$

Koefficienterna  $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$  och  $f$  förutsätts vara kontinuerliga funktioner av  $x$  i det betraktade intervallet.