

Lektion 18, Envariabelanalys den 7 december 1999

App. III.2 Antag att $f(x) \leq K$ i intervallen $[a, b]$ och $(b, c]$, och $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = L$. Visa att $L \leq K$.

I vanliga fall skulle vi bara hänvisa till instängningsprincipen och uppgiften skulle vara löst, men i detta fall ska vi gå tillbaka till definitionen av gränsvärde och med den som utgångspunkt visa uppgiften.

I en mera teoretisk uppgift av den här typen kan det vara bra att först tydligt skriva upp vad vi vet och vad vi vill visa.

Vi vet:

1. $f(x) \leq K$ överallt i $[a, c]$ utom möjligtvis i $x = b$,
2. $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = L$,

Vill visa:

3. $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = L \leq K$.

Punkt 2 översätter vi med gränsvärdesdefinitionen till

2*. Oavsett hur litet vi väljer $\varepsilon > 0$ så finns alltid ett $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ så att

$$L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon, \quad (*)$$

för alla x i en punkterad δ -omgivning av $x = b$.

Om vi plockar ut den viktiga informationen ur punkt 1 och 2* så säger den att i en punkterad δ -omgivning av $x = b$ så är

$$f(x) \leq K, \quad (1)$$

$$L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon. \quad (2)$$

Om det nu vore så att $L > K$, så skulle den vänstra olikheten i (2) vålla problem. För, säg att vi väljer $\varepsilon > 0$ så pass liten att $L - \varepsilon > K$ (vilket vi kan). Då säger (1) och (2) att

$$K < L - \varepsilon < f(x) \leq K,$$

vilket helt klart är orimligt. Alltså måste antagandet att $L > K$ vara fel, d.v.s. vi måste ha att $L \leq K$. VSB

App. III.4 Visa att följande funktioner är kontinuerliga,

- a) $f(x) = C$,
- b) $g(x) = x$.

Vi ska visa att

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \quad (*)$$

för alla reella tal a .

a) Om vi skriver (*) med gränsvärdesdefinitionen ska vi alltså visa att:

Oavsett hur litet $\varepsilon > 0$ vi väljer så finns det alltid ett $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ så att

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon \quad \text{för alla } x : 0 < |x - a| < \delta. \quad (\dagger)$$

Eftersom $f(x) = C$ för alla x så blir (\dagger),

$$0 < \varepsilon \quad \text{för alla } x : 0 < |x - a| < \delta.$$

Denna olikhet är alltid uppfylld om $\varepsilon > 0$.

b) I detta fall ska vi visa att:

Oavsett hur litet $\varepsilon > 0$ vi väljer så finns det alltid ett $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ så att

$$|g(x) - g(a)| < \varepsilon \quad \text{för alla } x : 0 < |x - a| < \delta. \quad (\dagger)$$

Med $g(x) = x$ blir (\dagger),

$$|x - a| < \varepsilon \quad \text{för alla } x : 0 < |x - a| < \delta.$$

Om vi väljer $\delta = \varepsilon$ så ser vi att (\dagger) är uppfylld.

App. IV.2 Låt

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{om } x = 1/n \text{ för } n = 1, 2, 3, \dots, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

Visa att f är integrabel över $[0, 1]$ och beräkna

$$\int_0^1 f(x) dx.$$

Låt oss först rekapitulera Riemannintegralens definition.

Till varje partition (indelning) P av intervallet $[0, 1]$ bildar vi en över- och undersumma,

$$U(P) = \sum_{i=0}^{n-1} M_i \Delta x_i,$$


$$L(P) = \sum_{i=0}^{n-1} m_i \Delta x_i,$$

där M_i är f :s största värde i det i :te delintervallet och m_i är f :s minsta värde i samma delintervall.

Oberoende av vilka partitioner P och P' vi väljer så kommer alltid en översumma vara större än en undersumma,

$$L(P') \leq U(P).$$

Om vi därför ritar ut de möjliga värdena för över- och undersummor på en tallinje, så kommer de typiskt att ha utseendet




Om det inte finns något gap mellan de två mängderna av möjliga värden på över- och undersummor eller om detta gap endast består av ett värde I , då är funktionen integrabel på intervallet och

$$\int_0^1 f(x) dx = I.$$


För att visa att gapet i vårt exempel högst består av ett värde ska vi ta fram en följd av partitioner $\{P_n\}$ så att

$$\lim_{n \rightarrow \infty} U(P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} L(P_n) = I.$$


Vi ska inte direkt skriva upp partitionen P_n , utan ta hjälp av en annan partition $P_{m,n}$. Partitionen $P_{m,n}$ ska vi bygga upp genom att stegvis lägga till delintervall som ska kapsla in de punkter där funktionen antar värdet 1; låt oss kalla dessa punkter för 1-punkter.



Det första delintervallet som vi lägger till är $[0, \frac{1}{n}]$, som ska fungera som ett ihopsamlingsintervall för alla 1-punkter som hopar sig kring $x = 0$.



Kring varje 1-punkt utanför $[0, \frac{1}{n}]$ skapar vi ett intervall med längd $\frac{1}{m}$ och centrerad kring punkten. Punkten $x = 1$ blir här ett undantag, där vi istället skapar ett intervall med $x = 1$ som höger ändpunkt.




Antalet sådana $\frac{1}{m}$ -delintervall blir $(n - 1)$ (kom ihåg att fr.o.m. $x = \frac{1}{n}$ så tillhör 1-punkterna delintervallet $[0, \frac{1}{n}]$).

Slutligen låter vi mellanrummen mellan de hittills definierade intervallen vara de sista delintervallen som vi lägger till vår partition $P_{m,n}$.

$$P_{m,n} : \text{Diagram showing the partition } P_{m,n} \text{ with intervals of length } 1/m \text{ and } 1/n.$$

Översumman till $P_{m,n}$ blir

$$U(P_{m,n}) = \sum M_i \Delta x_i = 1 \cdot \frac{1}{n} + (n - 1) \cdot 1 \cdot \frac{1}{m}$$



Låt nu P_n vara partitionen $P_n = P_{n^2, n}$. Då får vi att

$$U(P_n) = U(P_{n^2, n}) = \frac{1}{n} + \frac{n-1}{n^2} \rightarrow 0 \quad \text{då } n \rightarrow \infty.$$

Eftersom funktionen är positiv så måste vi ha att

$$0 \leq L(P_n) \leq U(P_n).$$

Instängningsprincipen ger att

$$\lim_{n \rightarrow \infty} L(P_n) = 0.$$

Vi har därmed visat att f är integrabel på $[0, 1]$, och att

$$\int_0^1 f(x) dx = 0.$$

App. IV.6 Använd definitionen av likformig kontinuitet för att visa att $f(x) = \sqrt{x}$ är likformigt kontinuerlig på $[0, 1]$.

Vi ska visa följande:

Oavsett hur litet $\varepsilon > 0$ vi väljer och oberoende av $a \in [0, 1]$ så finns ett $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ så att

$$|\sqrt{x} - \sqrt{a}| < \varepsilon \quad \text{för alla } x : 0 < |x - a| < \delta. \quad (*)$$

Det som tillkommit jämfört med gränsvärdesdefinitionen är att nu ska δ vara oberoende av a . Vi vill alltså kunna välja ett $\delta > 0$ så att vi utgående från


$$0 < |x - a| < \delta \quad (1)$$

kan härleda olikheten

$$|\sqrt{x} - \sqrt{a}| < \varepsilon, \quad (1)$$

helt oberoende av vilket värde a har.

Om vi ritar upp grafen till $y = \sqrt{x}$,



så ser vi att grafen har en lodrät tangent i $x = 0$. Det betyder att två punkter x och a som ligger nära varandra, $|x - a| < \delta$, i närheten av 0 kommer ha sina funktionsvärden på betydligt större avstånd än δ . Vi måste därför välja δ mycket mindre än ε , d.v.s. i en annan storleksordning än ε .

Välj därför $\delta = \varepsilon^2$. För att visa (2) delar vi upp härledningen i två delar.

$x > \varepsilon^2$: Vi har

$$|\sqrt{x} - \sqrt{a}| = \frac{|x - a|}{|\sqrt{x} + \sqrt{a}|} < \frac{\varepsilon^2}{\sqrt{\varepsilon^2} + 0} = \varepsilon.$$

$x \leq \varepsilon^2$: Vi har

$$|\sqrt{x} - \sqrt{a}| \leq |\sqrt{x} - 0| = \sqrt{x} \leq \sqrt{\varepsilon^2} = \varepsilon.$$

Alltså har vi utgående från (1) visat (2) med $\delta = \varepsilon^2$ (som är oberoende av a).