

## Inledande kurs i matematik, avsnitt P.1

**P.1.13** Lös olikheten  $-2x > 4$  och uttryck lösningen som ett intervall eller en union av intervall.

Multiplitera båda led med  $-\frac{1}{2}$ . Då byter också olikhetstecknet riktning,

$$\left(-\frac{1}{2}\right)(-2x) < \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot 4 \quad \Leftrightarrow \quad x < -2.$$

D.v.s. lösningen är det öppna intervallet  $(-\infty, -2)$ .



**P.1.15** Lös olikheten

$$5x - 3 \leq 7 - 3x,$$

och uttryck lösningen som ett intervall eller en union av intervall.

Precis som när vi löser en ekvation samlar vi först alla  $x$  i ena ledet. Addera båda led med  $3x$ ,

$$5x - 3 + 3x \leq 7 - 3x + 3x \quad \Leftrightarrow \quad 8x - 3 \leq 7.$$

För att få  $x$  ensamt i ena ledet adderar vi 3,

$$8x - 3 + 3 \leq 7 + 3 \quad \Leftrightarrow \quad 8x \leq 10.$$

Slutligen får vi ut  $x$  genom att dividera båda led med 8 (som är positiv och därför inte vänder på olikhetstecknet),

$$x \leq \frac{10}{8} = \frac{5}{4}.$$

Lösningintervall är alltså  $(-\infty, \frac{5}{4}]$ .



**P.1.17** Lös olikheten

$$3(2 - x) < 2(3 + x),$$

och uttryck lösningen som ett intervall eller en union av intervall.

Vi utvecklar båda led,

$$6 - 3x < 6 + 2x.$$

Samla  $x$  i ena ledet genom att addera med  $3x$ ,

$$6 - 3x + 3x < 6 + 2x + 3x \quad \Leftrightarrow \quad 6 < 6 + 5x.$$


Vi får  $x$  ensamt i ena ledet genom att addera med  $-6$ ,

$$6 - 6 < 6 + 5x - 6 \quad \Leftrightarrow \quad 0 < 5x.$$

Division med 5 ger svaret

$$0 < x,$$

vilket är intervallet  $(0, \infty)$ .



**P.1.19** Lös olikheten

$$\frac{1}{2-x} < 3,$$

och uttryck lösningen som ett intervall eller en union av intervall.

För att kunna "lösa ut"  $x$  vill vi multiplicera båda led med nämnaren  $2 - x$ , men vi vet inte om detta uttryck är positivt eller negativt, och därför inte hur olikhetstecknet påverkas av multiplikationen.

Om vi delar upp i två fall har vi

1.  $2 - x > 0$ :

I detta fall påverkas inte olikhetstecknet vid multiplikationen och vi får att

$$1 < 3 \cdot (2 - x) \quad \Leftrightarrow \quad 1 < 6 - 3x.$$

Addera med  $-6$ ,

$$-5 < -3x.$$

Dividera med  $-3$  (som är negativ och vänder på olikhetstecknet)

$$\frac{5}{3} > x.$$

Alltså, om  $2 - x > 0$ , d.v.s.  $x < 2$ , då är olikheten i uppgiftstexten uppfylld om  $x < \frac{5}{3}$ . Med andra ord är

$$\begin{aligned} \frac{1}{2-x} < 3 \quad \text{och} \quad 2-x > 0 &\Leftrightarrow x < 2 \quad \text{och} \quad x < \frac{5}{3} \\ &\Leftrightarrow x < \frac{5}{3}. \end{aligned}$$

Detta ger intervallet  $(-\infty, \frac{5}{3})$ .

2.  $2 - x < 0$ :

I detta fall multiplicerar vi olikheten med ett negativt tal och då vänds olikhetstecknet. Vi får

$$1 > 3 \cdot (2 - x) \quad \Leftrightarrow \quad 1 > 6 - 3x.$$

Addera med  $-6$ ,

$$-5 > -3x.$$

Dividera med  $-3$  (negativ),

$$\frac{5}{3} < x.$$

Vi har alltså visat att

$$\begin{aligned} \frac{1}{2-x} < 3 \quad \text{och} \quad 2-x < 0 &\Leftrightarrow x > 2 \quad \text{och} \quad x > \frac{5}{3} \\ &\Leftrightarrow x > 2. \end{aligned}$$

Detta ger intervallet  $(2, \infty)$ .

Sammantaget har vi alltså att olikheten är uppfylld om  $x < \frac{5}{3}$  eller  $x > 2$ , vilket svarar mot intervallen  $(-\infty, \frac{5}{3})$  och  $(2, \infty)$ .



**P.1.21** Lös olikheten

$$x^2 - 2x \leq 0$$

och uttryck lösningen som ett intervall eller en union av intervall.

Vänsterledet kan vi faktorisera, och skriva olikheten som

$$x(x - 2) \leq 0.$$


Med hjälp av teckenreglerna

$$+ \cdot + = +, \quad + \cdot - = -, \quad - \cdot + = - \quad \text{och} \quad - \cdot - = +$$

ser vi att vänsterledet är negativt om en faktor är negativ och den andra är positiv. Detta ger oss två fall.

1.  $x \leq 0$ ,  $x - 2 \geq 0$ . Detta ger att  $x \leq 0$  och  $x \geq 2$ , som saknar lösning.
2.  $x \geq 0$ ,  $x - 2 \leq 0$ . Detta ger att  $x \geq 0$  och  $x \leq 2$ , d.v.s.  $0 \leq x \leq 2$ .

Sammantaget är alltså olikheten uppfylld om  $0 \leq x \leq 2$ , vilket är intervallet  $[0, 2]$ .



**P.1.23** Lös olikheten  $x^3 > 4x$  och uttryck lösningen som ett intervall eller en union av intervall.

Vi samlar  $x$  i ena ledet,

$$x^3 - 4x > 0.$$

Vi ser direkt att vi kan bryta loss en faktor  $x$ ,

$$x(x^2 - 4) > 0.$$

Den andra faktorn kan vi faktorisera med konjugatregeln så att vi får en fullständig faktorisering av vänsterledet i förstagsgradsfaktorer,

$$x(x - 2)(x + 2) > 0.$$


Med teckenreglerna ser vi att vänsterledet är positivt om vi har en av följande konfigurationer:

$$1) + \cdot + \cdot +, \quad 2) + \cdot - \cdot - , \quad 3) - \cdot + \cdot - , \quad \text{eller} \quad 4) - \cdot - \cdot +.$$

Vi undersöker dessa fall.

1. Då ska vi ha att  $x > 0$ ,  $x - 2 > 0$ ,  $x + 2 > 0$ , d.v.s.  $x > 0$ ,  $x > 2$ ,  $x > -2$  vilket är detsamma som  $x > 2$ .
2. Vi ska ha att  $x > 0$ ,  $x - 2 < 0$ ,  $x + 2 < 0$ , d.v.s.  $x > 0$ ,  $x < 2$ ,  $x < -2$  som saknar lösning.
3. Vi ska ha att  $x < 0$ ,  $x - 2 > 0$ ,  $x + 2 < 0$ , d.v.s.  $x < 0$ ,  $x > 2$ ,  $x < -2$  som saknar lösning.
4. Vi ska ha att  $x < 0$ ,  $x - 2 < 0$ ,  $x + 2 > 0$ , d.v.s.  $x < 0$ ,  $x < 2$ ,  $x > -2$ . Detta kan vi skriva som  $-2 < x < 0$ .

Olikheten är alltså uppfylld om  $-2 < x < 0$  eller  $2 < x$ , vilket svarar mot intervallen  $(-2, 0)$  och  $(2, \infty)$ .



**P.1.25** Lös olikheten

$$\frac{x}{2} \geq 1 + \frac{4}{x},$$

och uttryck lösningen som ett intervall eller en union av intervall.

Flytta över alla termer i ena ledet

$$\frac{x}{2} - \frac{4}{x} - 1 \geq 0.$$

Skriv vänsterledet med minsta gemensamma nämnare,

$$\frac{x^2 - 8 - 2x}{2x} \geq 0.$$

Täljarpolynomet har nollställena

$$x_{\pm} = 1 \pm \sqrt{8 + 1} = 1 \pm 3 = \begin{cases} -2 \\ 4 \end{cases}$$

och kan faktoriseras som  $(x + 2)(x - 4)$ . Olikheten blir därför

$$\frac{(x + 2)(x - 4)}{2x} \geq 0.$$

Vänsterledet är positivt när ett av följande fall inträffar

$$1) \frac{+ \cdot +}{+}, \quad 2) \frac{+ \cdot -}{-}, \quad 3) \frac{- \cdot +}{-}, \quad \text{eller} \quad 4) \frac{- \cdot -}{+}.$$


Vi undersöker dessa fall

1. Vi har  $x + 2 \geq 0$ ,  $x - 4 \geq 0$ ,  $x > 0$ , d.v.s.  $x \geq -2$ ,  $x \geq 4$ ,  $x > 0$  som är ekvivalent med  $x \geq 4$ .
2. Vi har  $x + 2 \geq 0$ ,  $x - 4 \leq 0$ ,  $x < 0$ , d.v.s.  $x \geq -2$ ,  $x \leq 4$ ,  $x > 0$  som är ekvivalent med  $-2 \leq x < 0$ .
3. Vi har  $x + 2 \leq 0$ ,  $x - 4 \geq 0$ ,  $x < 0$ , d.v.s.  $x \leq -2$ ,  $x \geq 4$ ,  $x < 0$  som saknar lösning.
4. Vi har  $x + 2 \leq 0$ ,  $x - 4 \leq 0$ ,  $x > 0$ , d.v.s.  $x \leq -2$ ,  $x \leq 4$ ,  $x > 0$  som saknar lösning.

Sammantaget är olikheten uppfylld om

$$x \geq 4 \quad \text{eller} \quad -2 \leq x < 0,$$

vilket ger intervallen  $[-2, 0)$  och  $[4, \infty)$ .



Anm. Nämnaren får inte vara noll, vilket ger villkoret  $x > 0$  istället för  $x \geq 0$ .

**P.1.26** Lös olikheten

$$\frac{3}{x-1} < \frac{2}{x+1},$$

och uttryck lösningen som ett intervall eller en union av intervall.

Vi flyttar över alla termer i ena ledet

$$\frac{3}{x-1} - \frac{2}{x+1} < 0,$$

och skriver vänsterledet med minsta gemensamma nämnare,

$$\frac{3(x+1) - 2(x-1)}{(x-1)(x+1)} < 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{x+5}{(x-1)(x+1)} < 0.$$

Vänsterledet är negativt om vi har ett av följande fall

$$1) \frac{-}{+ \cdot +}, \quad 2) \frac{+}{- \cdot +}, \quad 3) \frac{+}{+ \cdot -}, \quad \text{eller} \quad 4) \frac{-}{- \cdot -}.$$

Vi undersöker dessa fall.

1. Vi har  $x+5 < 0$ ,  $x-1 > 0$ ,  $x+1 > 0$ , d.v.s.  $x < -5$ ,  $x > 1$ ,  $x > -1$  som saknar lösning.

2. Vi har  $x+5 > 0$ ,  $x-1 < 0$ ,  $x+1 > 0$ , d.v.s.  $x > -5$ ,  $x < 1$ ,  $x > -1$  vilket ger  $-1 < x < 1$ .


3. Vi har  $x+5 > 0$ ,  $x-1 > 0$ ,  $x+1 < 0$ , d.v.s.  $x > -5$ ,  $x > 1$ ,  $x < -1$  som saknar lösning.

4. Vi har  $x+5 < 0$ ,  $x-1 < 0$ ,  $x+1 < 0$ , d.v.s.  $x < -5$ ,  $x < 1$ ,  $x < -1$  vilket ger  $x < -5$ .

Alltså är olikheten uppfylld om

$$-1 < x < 1 \quad \text{eller} \quad x < -5,$$

d.v.s. om  $x$  tillhör intervallen  $(-1, 1)$  eller  $(-\infty, -5)$ .



**P.1.27** Lös ekvationen  $|x| = 3$ .

Ekvationen är ekvivalent med  $x = -3$  eller  $x = 3$ , vilka också är lösningarna.

**P.1.29** Lös ekvationen  $|2t+5| = 4$ .

Ekvationen är ekvivalent med

$$2t+5 = 4 \quad \text{eller} \quad 2t+5 = -4.$$

Eftersom dessa är förstgradsuttryck är ekvationerna enkla att lösa,

$$t = -\frac{1}{2} \quad \text{eller} \quad t = -\frac{9}{2}.$$

**P.1.31** Lös ekvationen  $|8 - 3s| = 9$ .

Vi skriver om ekvationen som två alternativa ekvationer utan beloppstecken,

$$8 - 3s = 9 \quad \text{eller} \quad 8 - 3s = -9.$$

Dessa två förstgradare har lösningarna

$$s = -\frac{1}{3} \quad \text{eller} \quad s = \frac{17}{3}.$$

**P.1.33** Bestäm intervallet som definieras av olikheten  $|x| < 2$ .

Beloppsolikheten är ekvivalent med

$$-2 < x < 2,$$

d.v.s. intervallet  $(-2, 2)$ .

**P.1.35** Bestäm intervallet som definieras av olikheten  $|s - 1| \leq 2$ .

Vi kan skriva upp en ekvivalent olikhet utan beloppstecken

$$-2 \leq s - 1 \leq 2.$$

Addera 1 till båda led,

$$-1 \leq s \leq 3.$$

Intervallet är alltså  $[-1, 3]$ .

**P.1.37** Bestäm intervallet som definieras av olikheten  $|3x - 7| < 2$ .

Vi kan skriva olikheten som

$$-2 < 3x - 7 < 2.$$

Addera 7 till alla led,

$$5 < 3x < 9.$$

Dela med 3,

$$\frac{5}{3} < x < 3.$$

Intervallet är alltså  $(\frac{5}{3}, 3)$ .

**P.1.39** Bestäm intervallet som definieras av olikheten  $|\frac{1}{2}x - 1| \leq 1$ .

Vi skriver upp olikheten utan beloppstecken,

$$-1 \leq \frac{1}{2}x - 1 \leq 1.$$

Addera 1 till alla led,

$$0 \leq \frac{1}{2}x \leq 2.$$

Multiplitera med 2,

$$0 \leq x \leq 4.$$


Intervallet är  $[0, 4]$ .

**P.1.41** Lös olikheten

$$|x + 1| > |x - 3|$$

genom att tolka olikheten som en utsaga om avstånd på reella tallinjen.

Vänsterledet  $|x - (-1)|$  är avståndet mellan  $x$  och  $-1$ , och högerledet  $|x - 3|$  är avståndet mellan  $x$  och  $3$ . Vi söker alltså alla punkter  $x$  med ett större avstånd till  $-1$  än dess avstånd till  $3$ .



Geometriskt ser vi att  $x$  måste ligga till höger om mittpunkten mellan  $-1$  och  $3$ , d.v.s.  $x > 1$ .

**P.1.44** Lös ekvationen  $|x - 1| = 1 - x$ .

Om  $x - 1 \geq 0$  då kan ekvationen skrivas som

$$x - 1 = 1 - x \quad \Leftrightarrow \quad x = 1.$$

Om  $x - 1 \leq 0$  då kan ekvationen skrivas som

$$-(x - 1) = 1 - x \quad \Leftrightarrow \quad 0 = 0.$$

som är uppfylld för alla  $x$  vi betraktar (d.v.s. för alla  $x$  som uppfyller  $x - 1 \leq 0$ ).

Ekvationen i uppgiftstexten är alltså uppfylld för alla  $x - 1 \leq 0$ , d.v.s.  $x \leq 1$ .