

Institutionen för matematik
KTH
Michael Benedicks

Tentamen i Komplex analys, SF1628, den 22 oktober 2011

Skrivtid 9.00-14.00. Inga hjälpmedel är tillåtna. Skriv tydliga lösningar med utförliga motiveringar.

För del **A** gäller följande. Uppgifterna poängsätts med maximalt 5 poäng per uppgift. Minst 21 poäng på A-delen ger betyg C och rätt att betygsättas på B-delen. Minst 17 poäng totalt ger betyg D och rätt att betygsättas på del B. 14 poäng ger betyg E. 13 poäng ger betyg Fx, med rätt till komplettering.

Bonuspoäng tillgodoräknas enligt följande. Den som är godkänd på kontrollskrivning 1 får 5 poäng och ska inte lösa uppgift 1 nedan. Den som är godkänd på kontrollskrivning 2 får 5 poäng och ska inte lösa uppgift 2 nedan. Uppgifterna 3 och 4 på tentan motsvarar de fem inlämningsuppgifterna. Man får tillgodoräkna sig maximalt resultat av det på inlämningsuppgifterna alternativt det på tentan. Uppgift 5 har ingen motsvarighet i kontrollskrivningar och inlämningsuppgifter.

För del **B** gäller följande. Först måste man vara godkänd på del **A** med betyg minst D, antingen via kontrollskrivningar och inlämningsuppgifter eller alternativt med komplettering med poäng erhållna på del A enligt ovan.

Betygsättningen görs sedan enligt följande:

Tre eller fler rätt lösta uppgifter på del B ger säkert betyg A.

Två rätt lösta uppgifter på del B ger säkert betyg B.

En rätt löst uppgift på del B ger säkert betyg C.

Betyg C kan också erhållas genom att man uppnår totalt minst 17 poäng på A-delen och minst 21 poäng på A- och B-del tillsammans. Härvid ger uppgifterna på B-delen maximalt 5 poäng vardera.

Det är viktigt att du anger ev. bonuspoäng på tentan.

Kontrollera bonuslistan hos skrivningsvakten.

Lycka till!

Var god vänd!

Del A.

1. Finn $a > 0$ så att det finns en analytisk funktion med realdel

$$e^{x^2-y^2} \cos axy.$$

Bestäm sedan *alla* sådana funktioner.

2. Taylorutveckla $f(z) = \log z$ omkring $z = -1$, där vi väljer den gren av den komplexa logaritmen, som är sådan att $f(-1) = \pi i$. Vad blir konvergensradien?

3. Hur många lösningar har ekvationen

$$z^5 + 2z^3 + 15z^2 + z + 1 = 0$$

i den öppna cirkelskivan $|z| < 2$?

4. Beräkna integralen

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{(x^2 + 4)^2} dx.$$

5. Finn en Möbiustransformation (bilinjär avbildning) sådan att $z_1 = 1$ avbildas på $w_1 = 0$, $z_2 = i$ avbildas på $w_2 = -2$ och $z_3 = -i$ på $w_3 = -1 - i$.

På vilket område avbildas enhetscirkelskivan $|z| < 1$ under denna avbildning?

Var god vänd!