

Uppgift 1. Finns det någon funktion $f = f(x, y)$ sådan att $D_1 f(x, y) = x + 4y$, $D_2 f(x, y) = 3x - y$?

Uppgift 2. Bestäm de partiella derivatorna av första ordningen till funktionen $f(x, y) = g(x^2 y, x \ln y)$ där g är en differentierbar funktion.

Uppgift 3. Ytan $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ och planet $x + y + z = 3$ skär varandra längs en kurva. Bestäm en riktningsvektor till skärningskurvas tangent i punkten $(2, -1, 2)$.

Uppgift 4. a) Visa att ekvationen $z^3 - xz - y = 0$ definierar z som en funktion av x och y i en omgivning till punkten $(1, 0, -1)$ ($z = \varphi(x, y)$).

b) Bestäm de partiella derivatorna $D_1 \varphi$, $D_2 \varphi$ och $D_{21} \varphi (= \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y})$ i punkten $(1, 0)$.

Lösningar och svar

1. Nej! Varför?

2. Låt $G(x, y) = (x^2y, x \ln y)$. Då är $f = g \circ G$. Jacobimatrisen av G är $J_G = \begin{pmatrix} 2xy & x^2 \\ \ln y & \frac{x}{y} \end{pmatrix}$. Enligt kedjeregeln $J_f(x, y) = J_g(G(x, y))J_G(x, y) = (D_1g \ D_2g) \begin{pmatrix} 2xy & x^2 \\ \ln y & \frac{x}{y} \end{pmatrix}$. Vi får $D_1f(x, y) = 2xy D_1g(x^2y, x \ln y) x + \ln y D_2g(x^2y, x \ln y)$ och $D_2f(x, y) = x^2 D_1g(x^2y, x \ln y) + \frac{x}{y} D_2g(x^2y, x \ln y)$.

3. Punkten $(2, -1, 2)$ ligger på skärningskurvan. Gradientvektorn till funktionen $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2 - 1$ är vinkelrät mot ytan $F(x, y, z) = 0$; $\text{grad}F(x, y, z) = 2(x + y - z)$. En normal till ytan i punkten $(2, -1, 2)$ är $n_1 = \frac{1}{2} \text{grad}F(2, -1, 2) = (2, -1, -1)$. Vektorn $n_2 = (1, 1, 1)$ är normal till planet. Båda normaler är vinkelräta mot skärningskurvans tangent. En riktningsvektor till tangenten är

$$n_1 \times n_2 = \det \begin{pmatrix} i & j & k \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = -3j + 3k = -3(j - k).$$

Svar: Vektorn $(0, 1, -1)$ är en riktningsvektor till tangenten.

4. På föreläsningen tisdagen den 28/10.