



KTH Matematik

Avd. Matematisk statistik

TENTAMEN I SF1904 MARKOVPROCESSER FREDAGEN DEN 19 AUGUSTI 2016 KL 08.00–13.00.

Examinator: Jimmy Olsson tel. 790 72 01.


Tillåtna hjälpmedel: Formel- och tabellsamling i Matematisk statistik, Mathematics Handbook (Beta), räknare.

Införda beteckningar skall förklaras och definieras. Resonemang och uträkningar skall vara så utförliga och väl motiverade att de är lätta att följa. Numeriska svar skall anges med minst två siffrors noggrannhet. Tentamen består av 5 uppgifter. Varje korrekt lösning ger 10 poäng. Gränsen för godkänt är preliminärt 20 poäng. Möjlighet att komplettera ges för tentander med 18–19 poäng. Tid och plats för komplettering kommer att anges på kursens hemsida. Det ankommer på dig själv att ta reda på om du har rätt att komplettera.

Tentamen kommer att vara rättad inom tre arbetsveckor från skrivningstillfället och kommer att finnas tillgänglig på studentexpeditionen minst sju veckor efter skrivningstillfället.

Uppgift 1

tt indikeringsinstrument växlar läge en gång per minut mellan de tre tillstånden $\mathbf{E} = \{normal, low, alert\}$. Systemet verkar befinna sig cirka 5 minuter åt gången i normalläget och kortare tid i de övriga två tillstånden, dock aldrig mer än en minut åt gången i *alert*. Efter noggrannare observationer har man uppskattat att växlingarna kan beskrivas av en Markovkedja med sannolikheter enligt övergångsgrafan



- Vilka värden ska vara istället för * och **? (1 p)
- Ange för de tre tillstånden vilket som svarar mot 0,1,2 i figuren. (2 p)
- Beräkna sannolikheten att vi under tio minuter står still i tillståndet *normal*. (2 p)
- Anta att man väljer X_0 slumpmässigt med sannolikheten $1/3$ för vardera tillstånd. Beräkna fördelningen för X_2 . (2 p)

- e) Under samma antagande som i (d). Beräkna sannolikheten att om vi efter 2 minuter befinner oss i *low* började vid minut 0 i *normal*. (3 p)

Uppgift 2

squar utför en slumpvandring på en (oändligt lång) bro byggd av sex parallella plankor i brons längdriktning. För varje steg framåt flyttar han sig dessutom 1 plankor åt höger, 1 plankor åt vänster eller fortsätter på samma plankor med sannolikhet $1/3$ vardera. Bron är lyckligtvis utrustad med skyddsräcken så att då Osquar befinner sig på en ytterplanka och försöker fortsätta utåt studsas han tillbaka till den näst yttersta plankan.

- a) Inför en lämplig modell och visa att det finns en asymptotisk fördelning för vilken plankor Osquar befinner sig på efter lång tid, samt beräkna hur stor andel av tiden Osquar befinner sig vid någon av ytterplankorna (i jämviktstillståndet). (5 p)
- b) Osquar startar på någon av mittenplankorna. Beräkna förväntat antal steg innan han för första gången stöter i skyddsräcket. (5 p)

Uppgift 3

åt $\{N(t); t \geq 0\}$ vara en Poissonprocess med intensitet λ . Som vi vet börjar den alltid med $N(0) = 0$. Vid tidpunkten 1 vet man att exakt ett hopp har inträffat, dvs. $N(1) = 1$. Om vi låter T vara den stokastiska variabeln som är tillfället (mellan 0 och 1) där detta hopp inträffade. I denna uppgift ska vi bestämma den betingade fördelningen för T givet $N(1) = 1$. Börja med att bestämma fördelningsfunktionen för T givet $N(1) = 1$, dvs. beräkna

$$F_{T|N(1)=1}(t) = P(T \leq t | N(1) = 1).$$

Identifiera sedan fördelningen för T givet $N(1) = 1$.

Tips: Använd lagen om total sannolikhet för $N(t)$. Tänk på vilka värden som $N(t)$ kan anta. (10 p)

Uppgift 4


varje dag på väg till jobbet går Helena in på ett cafe och köper en kaffe. Cafét där hon köper sitt kaffe kan betraktas som ett M/M/3 system i jämvikt med $\lambda = 10$ personer/ minut och betjäningssintensitet $\mu = 5$ personer/ minut. Antag att det under ett år är 200 arbetsdagar.

Beräkna sannolikheten att hon behöver köa färre än 150 av dessa dagar. Lämpliga och välmotiverade approximationer är tillåtna. (10 p)

Uppgift 5

n maskin består av tre komponenter, A , B , och C . Där A och B är parallellkopplade och C är seriekopplad med A och B , se schemat i bilden nedanför, för att maskinen ska fungera måste man kunna ta sig från vänster till höger i bilden genom fungerande komponenter. Komponenterna går sönder oberoende av varandra men bara när maskinen fungerar efter exponentialfördelade tider med intensiteterna λ_A, λ_B och λ_C . Där $\lambda_A = \lambda_B = 5$ och $\lambda_C = 2$. När en komponent går sönder repareras den med intensitet $\mu = 5$ oberoende av vilken komponent det är. Man har tillgång till 1 reparatör och när reparatören har påbörjat en reparation kommer den fortsätta att reparera den komponenten tills den är klar.

Ställ upp systemet och beräkna sannolikheten att maskinen fungerar efter lång tid. Beräkna också sannolikheten att reparatören arbetar.





KTH Matematik

Avd. Matematisk statistik

LÖSNINGAR TILL
TENTAMEN I SF1904 MARKOVPROCESSER
FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015 KL 08.00–13.00

Uppgift 1

- a) De saknade sannolikheterna är 0.8 och 0.2
- b) Vi har att 0 är normal, 1 är alert och 2 är low
- c) Den sökta sannolikheten är 0.8^{10}
- d) Vi söker $p^{(2)} = p^{(0)}P^2 = (19/30, 4/30, 7/30)$
- e) Sökt sannolikhet är

$$\mathbb{P}(X_0 = 0 \mid X_2 = 2) = \frac{\mathbb{P}(X_2 = 2 \mid X_0 = 0)\mathbb{P}(X_0 = 0)}{\mathbb{P}(X_2 = 2)} = \frac{(0.8 \cdot 0.1 + 0.1 \cdot 1 + 0.1 \cdot 0.2) \cdot 1/3}{7/30} = \frac{2}{7}$$

Uppgift 2

Vi låter $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ och $X_n =$ Osquars läge efter n steg, $n = 0, 1, 2, \dots$ där 1 och 6 är de två ytterplankorna. Då utgör $(X_n; n = 0, 1, 2, \dots)$ en Markovkedja i diskret tid. Av symmetriskäl kan vi låta $E = \{1, 2, 3\}$ där 1 är ytterplankan och kedjan får då övergångsmatrisen

$$P = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

Denna kedja är irreducibel ty $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ och aperiodisk (ty $p_{11} > 0$ t ex) och alltså är den ergodisk eftersom den är ändlig. Alltså existerar en unik asymptotisk fördelning $\underline{\pi} = (\pi_1, \pi_2, \pi_3)$ oavsett starttillstånd och $\underline{\pi}$ löser ekvationssystemet $\underline{\pi} = \underline{\pi} \cdot P$ samt $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$. Vi får alltså

$$\begin{aligned} \pi_1 &= \frac{1}{3}\pi_1 + \frac{1}{3}\pi_2 \\ \pi_2 &= \frac{2}{3}\pi_1 + \frac{1}{3}\pi_2 + \frac{1}{3}\pi_3 \\ \pi_3 &= \frac{1}{3}\pi_2 + \frac{2}{3}\pi_3 \end{aligned}$$

Första ekvationen ger $\pi_2 = 2\pi_1$ och tredje ekvationen ger $\pi_2 = \pi_3$ och detta insatt i normerings-ekvationen ger $1 = \pi_1(1 + 2 + 2)$ dvs $\pi_1 = 1/5$, $\pi_2 = \pi_3 = 2/5$. Andelen av tiden som Osquar befinner sig på ytterplankan är $\pi_1 = 1/5$.

b) Tillfoga ett absorberande tillstånd 0 som innebär krock med skyddsräcket. Vi får då en A-kedja med $A = \{0\}$ och $G = \{1, 2, 3\}$ och övergångsmatrisen

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

I enlighet med formelsamlingen inför vi $t_i = E(\text{tid till absorption} \mid \text{start i tillstånd } i)$ och där vi söker t_3 . Vi har då $t_i = 1 + \sum_{j \in G} p_{ij} t_j$ vilket ger

$$\begin{aligned} t_3 &= 1 + \frac{1}{3}t_2 + \frac{2}{3}t_3 \\ t_2 &= 1 + \frac{1}{3}t_1 + \frac{1}{3}t_2 + \frac{1}{3}t_3 \\ t_1 &= 1 + \frac{1}{3}t_1 + \frac{1}{3}t_2 \end{aligned}$$

Första ekvationen ger $t_2 = t_3 - 3$ och 3:e ekvationen ger $2t_1 = 3 + t_2 = 3 + (t_3 - 3) = t_3$. Andra ekvationen ger $2t_2 = 3 + t_1 + t_3$ och om vi sätter in de tidigare resultaten får vi $2(t_3 - 3) = 3 + \frac{1}{2}t_3 + t_3$ som ger $t_3 = \underline{18}$.

Uppgift 3

Uppgift 4

Uppgift 5